

Bulletin d'alerte sur la pyrale du buis et la processionnaire du pin

Reprise d'activité des chenilles hivernantes

Sommaire

pyrale du buis **P2**

Origine
Cycle biologique
Morphologie

Dégâts et plantes hôtes **P4**
Situation sanitaire
Moyens de lutte

Processionnaire du pin



*Une chenille de pyrale du buis
(Photo: expressions-venissieux.fr)*



*Chenille de processionnaire
du pin en procession
(Photo: wikipédia)*

Retrouvez les BSV sur
le site de la Chambre Régionale d'Agriculture ou le
site de la DRAAF
www.bulletinvegetal.synagri.com
<http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr>



● Origine

La pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) est un lépidoptère de la famille des Crambidae (Crambidae). Originnaire du Sud Est, elle a été découverte pour la première fois en Allemagne au milieu des années 2000 et, en France, en 2008.

● Cycle biologique

Les chenilles de la pyrale du buis deviennent actives au printemps (environ mi mars) et commencent alors à se nourrir. Les températures optimales auxquelles elles s'alimentent sont comprises entre 18°C et 30°C. Selon le climat, le cycle de la pyrale peut se répéter 2 à 3 fois par an.

● Morphologie

La chenille non urticante peut atteindre 50 mm de long. Son corps à dominante verte est doté de rayures blanches et jaunes et de séries de points noirs cerclés de blanc. Sa tête est noire luisante.

La chrysalide de 15 à 20 mm de long vire du vert au brun avec l'âge. Ce cocon de soie est tissé à l'intérieur du feuillage.

La papillon nocturne quant à lui a une envergure de 36 à 44 mm. Ses ailes habituellement blanches à reflets violets sont dotées d'une large bande brun-bronze. Le corps est généralement blanc sauf la tête, le prothorax et l'extrémité de l'abdomen qui sont brun-bronze. Il est rare que les ailes et le corps puissent être presque entièrement bruns.

Cycle de *Cydalima perspectalis* entre 18 et 30°C

Durée de vie
8 jours



Œufs par paquets de 10 à 20
au revers des feuilles



Éclosion après 7
jours environ

Papillon (36—44 mm)

Chenilles (38—50 mm)

10 jours



Chrysalide (15—20 mm)



20 à 30 jours
DEGÂTS!!!



Cycle de *Cydalima perspectalis* sur une année




Image:
jardinbiologique.com



Chenille de pyrale du buis
dans son logis hivernal
(Photo: www.insecte-net.fr)



Œufs de pyrale du buis
(Photo: www.insecte-net.fr)

● Dégâts et plantes hôtes

Les chenilles provoquent une défoliation importante et rapide des plants de buis. Pour l'instant ce ravageur n'a attaqué que du buis en France mais en Asie, on peut la retrouver sur du houx à feuilles pourpres (*Ilex purpurea*), sur fusain du Japon (*Euonymus japonicus*) et sur fusain ailé (*Euonymus alata*). Ce lépidoptère présente donc une menace pour les pépinières, les parcs, les jardins mais aussi les buissons de buis qui poussent de manière spontanée en forêt. Si l'attaque est trop importante, cette dernière peut devenir fatale pour le végétal. On peut détecter sa présence grâce aux fils soyeux et aux déjections verts foncés. L'aspect esthétique est également impacté par un brunissement du feuillage.

● Situation sanitaire

Apparue en France en 2008, la pyrale du buis est jugée préoccupante du fait de son arrivée récente sur le territoire Français et ses attaques sur des végétaux présents sur des sites à haute valeur touristique, paysagère.

Les signalements sont en augmentation. En France, en plus de 10 ans elle a conquis quasiment la totalité du territoire métropolitain.

En Bretagne la première détection a eu lieu en Août 2013 dans une pépinière du Morbihan. Depuis cette date la chenille ne fait que se propager vers le Nord et l'Ouest de la région.

Les chenilles hivernantes viennent de reprendre leur activité la semaine dernière. Le premier signalement nous vient de la commune de Vannes(56) où des chenilles venant d'émerger ont été observées. Même constat cette semaine sur la commune de Josselin. Cette reprise d'activité est plus tardive qu'en 2020 (3 semaines de retard). Ce décalage peut s'expliquer par le froid assez marqué que nous avons subi ces dernières semaines

Il est donc très important de bien inspecter les buis en « ouvrant » ceux-ci, les chenilles commençant leur travail par l'intérieur des buis.

● Moyens de lutte

La pyrale du buis qui émerge depuis quelques années sur le territoire national n'est pas réglementée. Elle constitue cependant un risque important, tant pour la biodiversité et l'esthétique des buis en production horticole, que pour les lieux fréquentés par le public, avec des répercussions possibles en termes économique, touristique et patrimonial.

Si vous possédez du buis il est fortement conseillé d'inspecter ceux-ci une fois par semaine, pour une détection précoce qui permettra d'enrayer plus facilement le ravageur et qui permettra de limiter les dégâts. Il faut souvent écarter les feuilles pour inspecter le cœur de l'arbuste.

Différents moyens de lutte sont envisageables:

En préventif:

- Mettre en place des pièges à phéromones qui permettent de capturer les mâles, donc limiter les fécondations de femelle et ainsi être avisé de leur présence pour une mise en alerte
- Afin de limiter l'apparition des premières chenilles au mois de mars, il est possible d'enlever et de brûler les cocons d'hivernages présents sur les buis du mois de novembre au mois de février
- couvrir des pieds sains d'un voile d'hivernage ou équivalent pour éviter qu'ils ne soient contaminés à leur tour

En curatif:

- Utiliser un aspirateur pour retirer les chenilles des buis
- Couper les parties atteintes et les brûler
- Si vous possédez des haies de buis ou des buis de grandes tailles, vous pouvez secouer ou frapper vos buis avec un bâton. Les chenilles étant sensibles aux vibrations, elles tomberont au sol. Pour faciliter le ramassage, disposer au préalable un filet ou un tissu au pied vos buis. Vous pourrez ensuite ébouillanter, écraser ou brûler les chenilles
- Lâcher des hyménoptères parasitoïdes oophages
- Si une de vos plantes est touchée ou en cas de capture d'un papillon dans un piège, vous devez informer le voisinage de la présence du ravageur
- Utiliser du bacille de Thuringe en lutte biologique et recourir à des mesures curatives chimiques en cas de nécessité seulement
- Des actions collectives de surveillance et de traitement sont indispensables pour limiter la propagation de la pyrale du buis
- La lutte chimique est possible mais est à limiter car elle impacte les autres insectes

● Processionnaire du pin

La processionnaire du pin (chenilles avec poils très urticants) a commencé ses descentes d'arbres, courant mars, vers le sol, pour s'enfouir dans la terre et se nymphoser. Il faut donc être très prudent et ne pas s'approcher des chenilles au sol.

Plus d'information sur le lien suivant:

http://www.fredon.fr/bretagne/actualites/flash-seve-ndeg69-mars-2021?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Flash_SEVE_N69_Mars_2021&utm_medium=email

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants : Pépiniéristes, Hervé LE SANN (Technicien indépendant), CATE, ASTREDHOR-STEPP, FREDON Bretagne, Conseil Général D'Ille et Vilaine

Direction de Publication

Chambre Régionale d'Agriculture
ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES
Tel : 02 98 88 97 71
Contact : Louis LE ROUX
Animateur inter-filières

Rédigé par :

FREDON Bretagne 5, Rue A. de St Exupéry
35235 THORIGNE FOUILLARD

Contacts :

- Julien KERVELLA : Animateur Cultures Ornementales et Zones non Agricole
06 01 59 44 77

Comité de Relecture : CATE, Hervé LE SANN (Technicien indépendant), ASTREDHOR-STEPP, Chambres d'agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL