



EN BREF cette semaine :

Toutes cultures

Attention aux pigeons et aux adventices sur culture d'été.

Pois

Des maladies présentes jusqu'à maturité.

Carotte

Premiers dégâts de sclérotinia.

Brocoli

Des ravageurs plus présents et de nombreux cas de bactériose sur tête.

Haricot

Comme pour la carotte, des symptômes de sclérotinia observés.

Céleri rave

Diminution de la pression des mouches.

Betterave potagère

Quelques maladies pénalisent cette culture.



Mouche de la carotte



Piéride du chou



TOUTES CULTURES

Adventices :

Sur carotte, sénéçons, matricaires, renoués liseron et morelle sont particulièrement difficiles à gérer. En haricot et flageolet, ce sont les amarantes, arroches, chénopodes, morelles mercuriales et atriplex qui posent des problèmes.

La gestion des adventices sur ces dernières cultures peut être mécanique lorsque le contexte le permet.

Pigeons :

Les dégâts sont moins préjudiciables à mesure que les différentes cultures concernées se développent, mais leur présence est toujours forte sur tous les secteurs.

POIS (récolte)

Maladies : *risque fort*

Même si le temps chaud et sec leur est défavorable, botrytis, anthracnose et mildiou sont toujours présents sur les parcelles non récoltées à ce jour.




Anthracnose sur pois


CAROTTE (jeunes carottes : récolte, grosses carottes : 12FV)

Mouche de la carotte : risque moyen

Les captures commencent à remonter dans certains secteurs. Même si les conséquences ne sont plus trop préjudiciables sur les parcelles de jeunes carottes proches de la récolte, il convient de prendre les mesures de protection nécessaire pour les grosses carottes.



La courbe ci-dessous intègre les données acquises sur céleri rave et montrent l'augmentation du nombre de captures (carotte et céleri rave confondus, correspondant au deuxième vol.



Noctuelles : *risque faible*

Des papillons sont toujours régulièrement visibles, dans plus de 3 parcelles sur 4, mais aucun dégât n'est à signaler pour l'instant.

Maladie : *risque faible à moyen*

Des dégâts de sclérotinia sont observés, en faible proportion.

BROCOLI (début pommaison - nouvelle plantation)

Mouche du chou : *risque faible*

Sur les nouvelles plantations, les pontes sont toujours très faibles, de l'ordre de 7 à 25 œufs par semaine pour 10 pièges (seul indicatif de risque 1 œuf par jour et par piège, soit 70 par semaine et par parcelle).

Papillons : *risque moyen à fort*

Avec des vols de piéride plus denses, les chenilles sont à surveiller car elles peuvent être responsables de défoliations importantes. Les noctuelles sont moins présentes.

Autres ravageurs : *risque faible à moyen*

Avec les températures chaudes, les populations d'altises augmentent rapidement. Moins préjudiciables sur des cultures développées, elles peuvent néanmoins ralentir significativement la croissance en cas de forte pression. Des populations faibles de pucerons sont visibles en parcelle.

Maladie : *risque moyen à fort*

Toujours de la bactériose à signaler sur les têtes de brocoli.

HARICOT (début floraison)

Ravageurs : *risque faible*

À part quelques dégâts de noctuelles défoliatrices, la situation est calme du côté des insectes ravageurs.

Maladie : *risque faible à moyen*

Sur les parcelles historiquement touchées, des symptômes de fusariose sont visibles. Ceci nous montre l'importance des rotations entre les cultures. Sur certaines parcelles très végétatives du centre Bretagne, les premières traces de sclérotinia sont observées.

CÉLERI RAVE (12 feuilles vraies)

Mouche de la carotte: *risque faible*

Comme sur culture de carotte, la pression réaugmente, signe du début du deuxième vol

Mineuse du céleri : *risque moyen à fort*

Après une diminution des captures, celles-ci s'intensifient à nouveau.



BETTERAVE POTAGÈRE (4 feuilles vraies)

Maladie : risque faible à moyen

Avec les fontes de semis et l'antracnose toujours présents, des dégâts moyens de cercosporiose sont visibles sur les quelques hectares suivis



Fonte de semis (photo S. Mouton—CA45)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :
CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE ST YVI, UNILET

Direction de Publication
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Antenne de Dinan ZA des Alleux
8E rue de la Bise 22100 TADEN
Tel : 02 96 85 89 42
Contact : Alix DELEGLISE

Rédaction : UNILET
6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex
Contacts :
- Frédéric LE GUENNOU, Mathieu SANDRONE
Co animateurs légumes industrie 02 98 39 33 24

- Jean Luc PEDEN
Animateur légumes
Comité de Relecture :
UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture