

### EN BREF cette semaine :

#### Adventices et généralités

État des lieux des graminées et dicotylédones en parcelle ; vigilance sur le datura

#### Haricot

Risque sclérotinia et botrytis en hausse

#### Brocolis

Présence de chenilles ; altises en baisse ; mouches du chou toujours en hausse

#### Carotte

Aucun ravageur signalé ou observé

#### Céleris

Vigilance mouche de la carotte



Mouches du chou sur brocolis – têtes (à gauche) et collet (à droite)



### TOUTES CULTURES

#### Adventices et généralités :

Les jeunes brocolis peuvent être désherbés mécaniquement lorsque les conditions sont réunies. Pour plus d'informations concernant les méthodes alternatives, se référer à la [note nationale](#) correspondante.

La présence de mercuriales, d'amarantes, d'arroches, de chénopodes, d'atriplex, de fumeterres, de matricaires, de morelles, de renouées, de séneçons et de chrysanthèmes des moissons est signalée.

Le datura stramoine est également observé dans les parcelles. À ce stade, seul l'arrachage manuel avant récolte est possible pour les cultures les plus exposées en cette période, à savoir les haricots et flageolets. Pour plus d'information à propos de cette adventice toxique, veuillez vous référer au BSV n° 16.

### HARICOT

#### Maladies fongiques : risque fort

Botrytis et sclérotinia sont toujours fortement présents sur haricot et représentent un danger non négligeable pour la culture, les conditions pluviométriques sont favorables à leur développement.

#### Héliotis : risque faible

Aucune noctuelle Héliotis n'est enregistrée sur les parcelles suivies cette semaine.

#### Pyrale du maïs : risque faible

Les effectifs de pyrale restent nuls sur l'ensemble du réseau de piégeage.

Pour rappel, il reste important pour les piégeurs de prendre garde aux confusions possibles entre tordeuse de l'œillet et pyrale du maïs. En effet, quelques tordeuses sont toujours constatées dans certains pièges. Pour plus de précisions, veuillez vous référer aux BSV N° 14 et 15.


### BROCOLIS

#### Noctuelles, teignes et piérides : risque moyen

On enregistre toujours une présence modérée de *Mamestra Brassicae* en Finistère sud. Quelques chenilles et dégâts liés sont observés en parcelle, notamment des chenilles de piérides.

#### Mouche du chou : risque fort

Le nombre de pontes augmente encore sur la plupart des parcelles suivies. Une grande partie d'entre-elles sont désormais proches du seuil indicatif de risque, notamment en Finistère et Morbihan sud. Le Morbihan nord est pour l'instant épargné. Si la dynamique se poursuit, les seuils indicatifs de risque pourraient être franchis dès la semaine prochaine.



#### Altises : risque moyen

La pression altise diminue cette semaine même si le ravageur reste présent sur chou. Il est nécessaire de rester vigilant quant à une possible recrudescence .


### CAROTTE

#### Maladies fongiques: *risque faible*


Aucune maladie n'est signalée sur carotte cette semaine mais la présence de sclérotinia sur les dernières parcelles de jeunes carottes et les conditions favorables à son développement incitent à rester vigilant sur grosses carottes.

#### Mouche de la carotte : *risque faible*

Toutes les parcelles jeunes carottes suivies ont été récoltées et le réseau s'étend sur grosses carottes. Aucune mouche n'a été piégée dans les parcelles de carottes suivies et la situation globale peut donc être considérée comme très calme pour le moment.



### Nombre moyen de mouches de la carotte piégées par semaine et par parcelle en 2017



## CÉLERI

### Mouche mineuse du céleri : risque faible

La parcelle ayant vu ses effectifs augmenter la semaine dernière sur le secteur de Guémené-sur-Scorff redescend à des valeurs négligeables, aucune mouche du céleri n'est piégée sur les autres parcelles du réseau.

### Mouche de la carotte : risque moyen

Une augmentation du nombre de mouche de la carotte est enregistré sur certaines parcelles (Ménéac, Riec-sur-Belon) sans pour autant représenter un vol général pour le moment. La vigilance est de rigueur. Le secteur de Guémené-sur-Scorff est toujours fortement touché sur céleri.

*Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.*

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :  
CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE ST YVI, UNILET

**Direction de Publication**  
Chambre d'Agriculture de Bretagne  
Aéroport CS 57946  
29679 MORLAIX Cédex  
02 98 88 97 71  
Contact : Louis LE ROUX

**Rédaction : UNILET**  
6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex  
Contacts :  
- Mikael BARRÉ - Frédéric LE GUENNOU  
Co-animateurs Légumes industrie 02 98 39 33 24

- **Comité de Relecture :**  
UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture