



EN BREF cette semaine :

Adventices et généralités

Contrôle des adventices : méthodes alternatives et désherbage mécanique
Forte présence de noctuelles gamma

Haricot

Le risque chenilles défoliatrices se maintient

Céleri

Vols locaux de mouche de la carotte ; vigilance septoriose

Brocolis

La pression défoliateurs se maintient malgré la fin du vol piéride

Carotte

Prudence mouches sur jeunes carottes (vol local et bruit de fond) ; hausse du risque oïdium et alternaria



Oïdium sur carotte



TOUTES CULTURES

Adventices et généralités :

Il est possible d'intervenir sur carottes buttées ou sur jeunes haricots. Les conditions sèches sont particulièrement favorables aux méthodes alternatives. Pour plus d'informations concernant les méthodes alternatives, se référer à la [note nationale](#) correspondante. La présence d'arroches, de chénopodes, de fumeterres, de matricaires, de morelles, de renouées, de séneçons, de souchet et de chrysanthèmes des moissons est signalée cette semaine.

HARICOT (1 FT à Récolte)

Heliotis & Pyrale : risque faible

Une héliotis est capturée sur le secteur de Loudéac en itinéraire technique bio, c'est bien au-dessous du seuil de risque défini à 7 individus / semaine. Surveillez cependant vos parcelles dès la floraison. Aucune pyrale n'est capturée.

Noctuelles gamma : risque moyen

Des défoliations sont encore signalées sur haricot, en particulier sur le Finistère sud, la pression globale des noctuelles gamma est par ailleurs forte sur toutes cultures.

Maladies fongiques : risque faible

Des symptômes de fusariose sont rapportés sur le secteur du Finistère sud mais l'impact reste pour le moment limité.

CELERI (Ø 3 cm à Ø 7 cm)

Septoriose : risque moyen

Des parcelles touchées par la septoriose sont toujours rapportées dans le Morbihan avec une évolution tenace des symptômes. Les températures s'élèvent et s'éloignent de l'optimum de développement de cette maladie mais il reste préférable d'en surveiller l'apparition sur les parcelles de céleri.

Mouche de la carotte : risque faible à moyen

Des effectifs non-négligeables (~8 / semaine / parcelle) sont piégés sur les secteurs Ménéac et Pontivy — Baud. La pression est difficile à évaluer car aucun seuil de risque n'est établi pour cette culture mais l'état des plantes doit être maintenu sous surveillance dans ces secteurs. Un bruit de fond est également perceptible ailleurs.

Mouche mineuse du céleri : risque faible

Trois mouches mineuses sont capturées sur le secteur de Pontivy — Baud, la situation reste calme partout ailleurs.

BROCOLIS (Reprise à 12 FV) – NAVETS

Altises : risque fort

La pression altise reste forte du fait des conditions climatiques même si la situation est sous contrôle sur de nombreuses parcelles. Les semis et jeunes pousses de navets doivent être maintenues sous surveillances au vu du contexte.

Noctuelles défoliatrices : risque fort

De nombreuses noctuelles gamma sont rapportées dans les pièges destinées aux *Mamestra brassicae* et témoignent d'une forte pression (> 10 individus par piège et par semaine).

Tenthredes : risque moyen à fort

Des adultes sont toujours observés sur les plaques collantes et la présence de nombreuses larves est rapportée dans les culture. La prudence est de mise, en particulier sur les cultures de navets dont le stade est sensible.

Piérade du chou : risque moyen

Aucun papillon n'est signalé cette semaine mais les pontes des vols précédents doivent inciter à la vigilance. Par ailleurs, le risque lié aux chenilles défoliatrices au sens large reste élevé.

Mouche du chou : risque faible à moyen

Les pontes restent fortes sur la parcelle expérimentale et inférieures au seuil sur les autres parcelles du réseau. Deux nouveaux pièges seront installés sur le secteur Pontivy – Ploërmel en cette fin de semaine.


Cécidomyie du chou-fleur : risque faible

Les piégeages de cécidomyies restent nuls sur chou-fleur.

N° 17 - 3 Août 2018, page 4 sur 4

CAROTTE (R-15 à Récolte pour jeunes carottes ; 5 FV à Ø 3 cm pour grosses carottes)

Mouche de la carotte : *risque faible à moyen*



Une parcelle de jeune carotte dépasse le seuil de risque sur Elliant. Un bruit de fond est par ailleurs de retour sur une grande partie des parcelles de jeunes carottes restantes (~ 1 à 2 mouches / semaine). La dynamique est inquiétante sur jeune carotte mais calme sur grosses carottes. Le réseau est élargi de huit nouvelles parcelles pour assurer la continuité des piégeages.

Maladies fongiques : *risque moyen*

Des symptômes d'oïdium sont signalés sur le Morbihan et l'alternaria s'étend sur tout le secteur de culture. Des dégâts de sclérotinia sont par ailleurs rapportés sur les récoltes de jeunes carottes.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :
CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE ST YVI, UNILET

Direction de Publication
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Aéroport CS 57946
29679 MORLAIX Cédex
02 98 88 97 71
Contact : Louis LE ROUX

Rédaction : UNILET
6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex
Contacts :
- Mikael BARRÉ – Frédéric LE GUENNOU
Co-animateurs Légumes industrie 02 98 39 33 24

- Comité de Relecture :
UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture