



EN BREF cette semaine :

Adventices et généralités

Contrôle des adventices : méthodes alternatives et désherbage mécanique

Haricot

Pression sclérotinia en régression sur le Finistère

Céleri

Présence septoriose à surveiller

Epinards

Vol noctuelle gamma localisé (Coray, Finistère sud)

Brocolis & Navet

Attention aux pontes suite aux vols de piérides

Carotte

Présence oïdium à surveiller, foyers d'alternaria sur certaines parcelles



Noctuelle *Autographa gamma*



TOUTES CULTURES

Adventices et généralités :

Des amarantes, arroches, atriplex, chénopodes, fumeterres, matricaires, mercuriales, morelles, renouées, séneçons et chrysanthèmes des moissons sont signalées en parcelles. Pour plus d'informations concernant les méthodes alternatives, se référer à la [note nationale](#) correspondante.

HARICOT (R-15 à Récolte)

Heliotis & Pyrale : *risque faible*

Les derniers piégeages pyrales ne comptent aucune capture, de même que les quelques pièges héliotis restant.

Pucerons noirs : *risque faible*

Des foyers très localisés de pucerons noirs sont signalés dans les parcelles, les températures élevées nuisent à leur développement et ils ne sont donc pas source d'inquiétude pour le moment.

Maladies fongiques : *risque moyen*

La pression sclérotinia régresse sur le Finistère sud mais maintient une pression constante sur le Morbihan.

CELERI (Ø 5 cm à Ø 15 cm)

Septoriose : *risque moyen*

La septoriose maintient une présence dans de nombreuses parcelles et une progression lente sur certaines. La situation n'est pas inquiétante mais il est nécessaire de surveiller l'évolution de la situation.

Mouche de la carotte : *risque faible*

Une parcelle du secteur Pontivy-Ploërmel (Ménéac) enregistre 4 mouches de la carotte, il n'existe pas de seuil de risque pour cette culture mais cette valeur reste relativement faible. Le reste du réseau est indemne de captures.

Mouche mineuse du céleri : *risque faible*

Seules 2 mouches sont relevées en contexte expérimental, aucune capture ni aucune mine ne sont constatées au sein du réseau.


EPINARD (2 FV à 8 FV)

Limace : *risque faible*

Les relevés limaces n'enregistrent toujours aucune capture pour le moment.

Autographa gamma : *risque faible (localement fort)*

Comparaison de la moyenne des effectifs de noctuelle gamma de 2018 à celle de 2001 à 2017



Un pic local est enregistré sur Coray (Finistère sud, secteur Quimper) avec 18 individus piégés / parcelle / semaine pour un seuil de risque établis à 10. La situation globale reste calme (0 à 2 individus) mais ce premier pic incite à une grande vigilance au cours de la semaine qui vient, d'autant plus que les conditions météorologiques prévues sont favorables à l'émergence de ce ravageur – temps chaud et ensoleillé – et la fin de saison est souvent marquée par des vols d'ampleur.

BROCOLIS (Pommaison à Récolte) – NAVETS

Noctuelles défoliatrices & piérides : *risque moyen à fort*

Les vols de piérides se font plus éparés mais les pontes de la semaine précédente constituent un risque, particulièrement en cette période de pommaison où les chenilles peuvent provoquer une pollution des têtes. De faibles piégeages de *Mamestra brassicae* sont toujours constatés dans le Morbihan. D'après les prévisions météorologiques, les conditions redeviendront favorables aux lépidoptères ravageurs sur tout le secteur de culture en semaine 38.

Tenthredes : *risque fort*

La pression tenthrede s'intensifie sur navet, en particulier dans le Finistère sud.

Mouche du chou : *risque faible*


Le nombre d'œufs relevés dans les pièges reste au-dessous du seuil de risque (0,5 à 0,7 œuf / piège / semaine). Bien que les tendances saisonnières soient rassurantes, une vigilance doit être maintenue au cours des semaines qui viennent du fait des températures douces.

Cécidomyie du chou-fleur : *risque faible*

Aucune cécidomyie n'est identifiée dans les derniers piégeages. La parcelle qui compte ces pièges est récoltée et la période n'est plus considérée comme à risque concernant ce ravageur, ils ne seront donc pas transférés.

CAROTTE (Ø 2 cm à Ø 5 cm)

Mouche de la carotte : risque faible



Les effectifs de mouches de la carotte restent nuls cette semaine. Les tendances saisonnières sont rassurantes mais les prévisions météorologiques chaudes de la semaine 38 incitent à maintenir une surveillance.

Maladies fongiques : risque fort

Les pressions oïdium et alternaria se maintiennent à un niveau sensiblement égal. Les atteintes d'alternaria sont préoccupantes sur certaines parcelles, l'oïdium maintient sa présence sur tout le secteur bien que les conditions hygrométriques lui soient moins favorables qu'il y a quelques semaines.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :
CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE ST YVI, UNILET

Direction de Publication
Chambre d'Agriculture de Bretagne
Aéroport CS 57946
29679 MORLAIX Cédex
02 98 88 97 71
Contact : Louis LE ROUX

Rédaction : UNILET
6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex
Contacts :
Frédéric LE GUENNOU
Animateur légumes industrie 02 98 39 33 24

- Comité de Relecture :
UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture