

SOMMAIRE


[Carottes](#)..... p2.

[Haricots](#)..... p3.

[Zoom](#)..... p5.

[Données météo](#)..... p6.

Indicateurs de risque			
Culture	Stade	Ravageurs	Maladies
Carotte	1-2 F à Ø Récolte	Mouche de la carotte 	
		Pucerons 	
Haricots	Levée à 1 ^{ère} fleur	Mouche des semis 	Fonte de semis 
		Noctuelle héliothis 	
		Noctuelle défoliatrice 	



Légende pictogrammes

	Prophylaxie
	Biocontrôle
	Résistances variétales



Retrouver toutes les notes biodiversité : [Notes Nationales Biodiversité](#) | [Ecophytopic](#)

CAROTTES



Ravageurs

Mouche de la carotte

- **Observations**

Cette semaine, sept pièges sont encore en place, dont trois sont toujours installés dans des parcelles de céleri-rave. Les relevés montrent que le niveau de captures demeure globalement faible sur l'ensemble du réseau de surveillance. Aucune des parcelles suivies n'a enregistré un nombre de captures supérieur au seuil indicatif de cinq mouches par piège.

- **Analyse du risque**

Risque faible.

- **Gestion du risque**

Suivant les observations et le relevé des pièges en place.



Respecter un délai d'au moins 5 ans entre deux cultures d'ombellifères (carotte, céleris, panais, persil...). En cas de problème important : éloigner pendant plusieurs années les cultures de carottes des foyers où les dégâts de mouche ont eu lieu.

Pucerons

- **Observations**

Aucun foyer n'a été détecté à ce jour et la pression du ravageur reste nulle.

- **Analyse du risque**

Risque faible.

- **Gestion du risque**

Surveiller les plaques engluées ou faire des comptages au champ.



Symptômes de Chancre de chaleur
Crédit photo : Laboratoire d'expertise et de diagnostic en
phytoprotection - MAPAQ

PROBLÈMES PHYSIOLOGIQUES - HEAT CANKER (Chancre de chaleur)

Des problèmes physiologiques sont actuellement observés sur de nombreuses parcelles de carottes, avec une intensité plus marquée sur les derniers semis, tous secteurs confondus.

Les symptômes correspondent au **Heat Canker**, un désordre physiologique provoquant la mortalité des jeunes plants, principalement entre le stade 2 feuilles cotylédonaires (2 FC) et 3 à 4 feuilles. Les plantes présentent un étranglement de la racine juste sous le collet, ce qui perturbe la circulation de la sève et l'alimentation de la plante. Les jeunes plants se dessèchent progressivement, puis dépérissent.

Ce phénomène est favorisé par des températures très élevées à la surface du sol, qui provoquent des lésions au niveau du collet. Les conditions chaudes et ensoleillées observées ces dernières semaines ont ainsi été propices à l'apparition de ces symptômes.



HARICOTS

Ravageurs

Mouche des semis

- **Observations**

Aucune attaque de mouche des semis n'a été observée sur les parcelles de haricot suivies par le réseau. À ce jour, aucun dégât imputable à ce ravageur n'a été signalé cette semaine et la pression est considérée comme nulle.

- **Analyse du risque**

Risque faible.

- **Gestion du risque**

Il est recommandé d'éviter les apports de fumures organiques peu de temps avant le semis. Les fumures organiques ainsi que les cultures intermédiaires doivent être incorporées suffisamment tôt, idéalement plus d'un mois avant le semis, afin de favoriser leur décomposition.



Noctuelle héliothis

- **Observations**

Quatorze pièges sont en place cette semaine sur le réseau de surveillance. Dans le Morbihan et le Finistère, le nombre de captures est en légère augmentation par rapport à la semaine précédente mais les niveaux observés restent faibles. En Vendée, les captures sont en diminution, traduisant un recul de la pression du ravageur. En Loire-Atlantique, un seul des pièges a enregistré 27 adultes capturés en dix jours. Une vigilance renforcée est recommandée dans les parcelles suivies.

- **Analyse du risque**

Risque faible en Bretagne.

Risque moyen en Vendée et Loire-Atlantique.

- **Gestion du risque**

Le maintien de la surveillance permettra de suivre l'évolution des vols dans les prochaines semaines.



Parcelle de haricots - Crédit photo UNILET



Noctuelle du chou *Mamestra brassicae*

• Observations

Des relevés de noctuelles ont été signalés sur trois parcelles du réseau, situées à Rosporden, Inguiniel et Cléguérec.

Les observations ont été réalisées sur des cultures au stade 1 feuille trifoliée. Les dégâts sont importants, avec des attaques affectant directement les jeunes plants de haricot. Les comptages font état de 1 à 3 chenilles par plante sur les parcelles concernées.

Au vu des observations de terrain, les chenilles appartiennent très probablement à *Mamestra brassicae* (noctuelle du chou). Une surveillance attentive des parcelles est recommandée, en particulier sur les jeunes cultures, afin de suivre l'évolution des populations et de l'intensité des dégâts.)

• Analyse du risque

Risque moyen à fort.

• Gestion du risque

Surveillance de toutes les parcelles à un stade précoce (1 FT et plus).



Papillon noctuelle défoliatrice
Mamestra brassicae
Crédit photo UNILET



Chenille *Mamestra brassicae*
Crédit photo UNILET

Maladies

Fonte de semis

• Observations

Pas ou peu de constat de maladies en haricots actuellement au vu du contexte météorologique.

• Analyse du risque

Risque faible.

• Gestion du risque

Respect des rotations.



Zoom sur les dégâts liés aux différents ravageurs



Les dégâts de **mouche des semis** sont multiples : manques à la levée, plants borgnes, galeries dans les racines et les tiges. Ces perforations sont des portes d'entrée idéales pour les champignons du sol responsables des nécroses racinaires.



Pucerons noirs sur haricots : en cas de populations importantes, les pucerons peuvent réduire la vigueur des plantes. Leurs piqûres déforment feuilles et gousses et peuvent être vecteurs de virus.




Le haricot devient attractif pour la **pyrale du maïs** à partir du stade 2-3 feuilles trifoliées. Les parcelles cultivées après ou à proximité d'un maïs sont les plus exposées. La chenille de pyrale est foreuse : elle perce les tiges, ce qui fragilise les plantes, et colonise les gousses.



Noctuelle héliothis : papillon, œuf, chenilles et dégâts sur gousses de haricots.



La noctuelle défoliatrice *Autographa gamma* présente deux caractéristiques : un papillon avec un "gamma" sur chaque aile antérieure, une chenille avec deux paires de fausses pattes abdominales. Ses dégâts se limitent au feuillage.



La chenille de **noctuelle héliothis** se présente sous différentes couleurs : verte, brune ou jaune. Elle est cependant reconnaissable par ses deux bandes longitudinales et ses quatre paires de fausses pattes abdominales. C'est une chenille foreuse : elle perce les gousses, à la recherche du grain.

Source : guide sanitaire UNILET 2026



DONNÉES MÉTÉO

Stations	Températures moyennes (°C)		Pluviométrie (mm)	
	Juin 2026	1 ^{er} au 9 juillet	Juin 2026	1 ^{er} au 9 juillet
BRENNILIS (29)	17.6	18.7	71.6	1.0
CORAY (29)	18.4	20.0	52.2	0.6
SAINT-SEGAL (29)	18.8	20.4	52.2	0.0
TREGUNC (29)	19.2	20.5	26.6	0.0
LORIENT (56)	19.0	20.4	26.7	0.0
PLOËRMEL (56)	20.5	21.6	29.6	0.0
PONTIVY (56)	19.6	21.1	31.6	0.2
VANNES (56)	19.5	21.1	39.5	0.2
LA ROCHE SUR YON (85)	21.8	23.5	16.7	0.0

Prévisions Météo France - Bretagne :

[PREVISIONS METEO FRANCE - Site Officiel de Météo-France - Prévisions gratuites à 15 jours sur la France et sur le monde](#)



Ecophytopic : le portail de la Protection Intégrée des Cultures

[Portail | Ecophytopic](#)



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Légumes de transformation sur les sites internet suivants :

Chambre d'Agriculture de Bretagne :
<https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

DRAAF Bretagne :
<https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr>

Direction de Publication :
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne
Animatrice inter-filières :
Françoise MAHEO
Tél : 06 43 18 94 19

Rédigé par :
UNILET
Animateur Légumes de transformation :
Pierre LE FLOCH
Tél. 02 98 39 33 24

Action co-pilotée par les ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche avec l'appui financier de l'Office Français pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.