


SOMMAIRE

[Carottes](#)..... p2.
[Haricots](#)..... p3.
[Zoom](#)..... p5.
[Données météo](#)..... p7.

Indicateurs de risque			
Culture	Stade	Ravageurs	Maladies
Carotte rondelles et grosses carottes	Ø 1 à 2 cm	Mouche de la carotte 	
		Pucerons 	
Haricots	2 FC à Récolte	Noctuelle héliothis 	
		Noctuelles défoliatrices 	
		Cicadelle verte 	



Légende pictogrammes

Prophylaxie

Biocontrôle

Résistances variétales

Retrouver toutes les notes biodiversité : [Notes Nationales Biodiversité | Ecophytopic](#)

CAROTTES

Ravageurs

Mouche de la carotte

- **Observations**

Cette semaine, sept pièges sont maintenus au sein du réseau de surveillance. Les observations indiquent que les captures restent faibles sur l'ensemble des sites suivis. Aucun piège n'a atteint le seuil indicatif de risque fixé à cinq mouches capturées par piège. À ce stade, la pression exercée par le ravageur demeure faible sur le réseau d'observation.

- **Analyse du risque**

Risque faible.

- **Gestion du risque**

Suivant les observations et le relevé des pièges en place.



Respecter un délai d'au moins 5 ans entre deux cultures d'ombellifères (carotte, céleri, panais, persil...). En cas de problème important : éloigner pendant plusieurs années les cultures de carottes des foyers où les dégâts de mouche ont eu lieu.

Pucerons

- **Observations**

Les observations réalisées cette semaine dans les parcelles du réseau de surveillance ne révèlent toujours aucune présence du ravageur. Aucun individu ni symptôme caractéristique d'une infestation n'a été observé. À ce stade, aucun risque n'est mis en évidence sur le réseau d'observation.

- **Analyse du risque**

Risque faible.

- **Gestion du risque**

Surveiller les plaques engluées ou faire des comptages au champ.



Micro-parcelles de carotte - Crédit photo UNILET

HARICOTS

Ravageurs

Noctuelle héliothis armigera (cf. zoom)

- **Observations**

Sur la vingtaine de pièges en place au sein du réseau de surveillance, cette semaine, des captures sont encore enregistrées dans plusieurs secteurs. Les relevés varient généralement de 2 à 3 individus par piège, avec toutefois des niveaux globalement en baisse par rapport à la semaine précédente. Le maximum observé est de 40 captures sur un site. Le vol est toujours en cours sur certains secteurs, notamment à Plouider, Rosporden, Lanvaudan, Pluméliau-Bieuzy et Noyal-Pontivy. En Vendée, les captures restent faibles. Seul un piège a enregistré une quinzaine d'individus capturés, tandis que les trois autres pièges n'ont relevé aucune capture.

Une vigilance particulière reste recommandée sur les cultures, les premiers dégâts ayant été constatés.

- **Analyse du risque**

Risque fort.

- **Gestion du risque**

Le maintien de la surveillance permettra de suivre l'évolution des vols.

Emploi de produits à base de *Bacillus thuringiensis* ou de spinosad sur jeune stade larvaire.



Dégâts d'héliothis sur haricots
Crédit photo TERRES DE L'OUEST

Noctuelles défoliatrices : noctuelle du chou (*Mamestra brassicae*) et légionnaire de la betterave (*Spodoptera exigua*)

- **Observations**

Les observations confirment le maintien de la présence de noctuelles dans plusieurs parcelles du réseau, notamment à Rosporden, Saint-Pol-de-Léon et Plouider.

La surveillance des parcelles reste recommandée afin de suivre l'évolution de la pression et d'évaluer le risque pour les cultures.

- **Analyse du risque**

Risque moyen.

- **Gestion du risque**

Surveillance de toutes les parcelles à un stade précoce.

Emploi de produits à base de *Bacillus thuringiensis* ou de spinosad plus particulièrement si attaque de la chenille légionnaire de la betterave.

B

B



Cicadelle verte

• Observations

Les premiers individus sont observés dans certaines parcelles de haricots. Les larves et les adultes se nourrissent en piquant les feuilles, ce qui peut provoquer des ponctuations chlorotiques puis un jaunissement et un dessèchement des bords du limbe en cas de fortes populations.



Cicadelle verte

Crédit photo : <https://agro.bayer.fr>

• Analyse du risque

Risque faible.

• Gestion du risque

La pression est généralement faible en Bretagne, mais une surveillance est recommandée, notamment en période chaude et sèche, afin de suivre l'évolution des populations et l'apparition d'éventuels symptômes.

DATURA : RESTER VIGILANT (cf. zoom)

Le datura est toujours présent sur l'ensemble de la Bretagne.

- Des signalements sont recensés dans de nombreuses parcelles, mais les niveaux d'infestation demeurent généralement **faibles à très faibles**.
- Les levées se poursuivent, notamment dans les **parcelles déchaumées**.
- Une **épuration manuelle précoce** des plantes reste le moyen le plus efficace pour limiter la production de graines et empêcher la dissémination de cette adventice toxique.
- Maintenir une **surveillance régulière** des parcelles jusqu'à la récolte afin d'intervenir rapidement en cas de nouvelles levées.



Haricots en gousse - Crédit photo UNILET

ZOOM sur les daturas (cf. note nationale *Datura*)

Fiche d'identification		
LSV	Le genre <i>Datura</i> (Solanaceae) en France	 anses

Plante robuste, à tige épaisse, se ramifiant en parasol.

Feuilles pétiolées, entières ou souvent grossièrement dentées.

Fruit: grosse capsule ovoïde généralement épineuse (3).

Fleur solitaire, grande, blanche ou mauve, pédicellée, pentamère (1); calice tubulaire à lobes dentiformes; corolle en trompette, plissée longitudinalement, à lobes à peine marqués, mais à apex matérialisés par de longs mucrons (1, 2).





Datura ferox

Datura wrightii

Datura stramonium

4 espèces présentes en France

2 pérennes

Datura wrightii,
Datura innoxia (en bas à droite)

2 annuelles


Datura ferox

Datura stramonium





Identification des espèces



HABITATS ET IMPACTS

Les espèces de *Datura* se développent dans les zones perturbées (les bords de routes, les fossés, les bords de rivières, les friches et les cultures). Toutes sont extrêmement toxiques car elles contiennent des alcaloïdes très puissants qui peuvent provoquer des intoxications très graves, même en très petites quantités. En agriculture, *D. stramonium* est une adventice qui peut être problématique, surtout dans les cultures estivales, ainsi que dans les cultures destinées aux conserves en raison de sa toxicité.

OÙ LA TROUVER ? QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION ?

En cas de doute, des photos ou des échantillons peuvent être prélevés, puis envoyés à l'adresse suivante pour identification : ANSES-LSV Unité d'entomologie et botanique, 755 avenue du campus Agropolis, CS 30016 34988 Montferrier-sur-Lez cedex, email: guillaume.fried@anses.fr



DONNÉES MÉTÉO

Stations	Températures moyennes (°C)		Pluviométrie (mm)	
	Juillet 2026	1 ^{er} au 6 août	Juillet 2026	1 ^{er} au 6 août
BRENNILIS (29)	19.9	18.5	12.4	0.2
CORAY (29)	21.3	20.0	10.6	1.4
SAINT-SEGAL (29)	21.5	19.6	32.2	0.2
TREGUNC (29)	22.7	20.6	3.2	0.0
LORIENT (56)	22.4	21.3	1.8	0.0
PLOËRMEL (56)	22.5	20.5	60.1	0.0
PONTIVY (56)	21.8	21.0	4.4	0.0
VANNES (56)	22.5	20.5	31.9	0.0
LA ROCHE SUR YON (85)	24.7	23.8	7.4	0.2

Prévisions Météo France - Bretagne :

[PREVISIONS METEO FRANCE - Site Officiel de Météo-France - Prévisions gratuites à 15 jours sur la France et sur le monde](#)



Ecophytopic : le portail de la Protection Intégrée des Cultures

[Portail | Ecophytopic](#)



[R4P – Réseau de Réflexion et de Recherches sur les Résistances aux Pesticides \(r4p-inra.fr\)](#)



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Légumes de transformation sur les sites internet suivants :

Chambre d'Agriculture de Bretagne :
<https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

DRAAF Bretagne :
<https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr>

Direction de Publication :
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne
Animatrice inter-filières :
Françoise MAHEO
Tél : 06 43 18 94 19

Rédigé par :
UNILET
Animateur Légumes de transformation :
Pierre LE FLOCH
Tél. 02 98 39 33 24

Action co-pilotée par les ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche avec l'appui financier de l'Office Français pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.