

Sommaire**Données météo** [P2](#)**Colza** [P2/P5](#)**Légende :**

Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**OFB**
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉFinancé dans le cadre
de la stratégie **écophyto****GOUVERNEMENT**Liberté
Égalité
Fraternité

Action de la stratégie écophyto 2030 pilotée par les ministères chargés de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et de la Recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

	Indicateurs de risque	L'essentiel
Stades du colza : les parcelles sont majoritairement au stade C1 : reprise de végétation. Les stades observés sont ceux des variétés d'intérêts. Les variétés à floraison précoce qui y sont associées ne sont et ne doivent pas être prises en compte.		
Charançon de la tige du colza		<p>Aucune capture du charançon. Conditions météo assez peu favorables. Ne pas confondre avec celui de la tige du chou.</p> <p>Détail dans ce BSV en cliquant ici</p>
Hernie des crucifères : Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, remplir l'enquête de Terres-Inovia. Enquête Hernie—cliquez ici		
Autres observations : Quelques parcelles avec de la cylindrosporiose et du mycosphaerella. À bien distinguer des autres maladies foliaires.		


LES ACTUALITES DU MOMENT**ACTU TECHNIQUE :****La cuvette jaune**

c'est la période pour positionner les cuvettes jaunes dans les parcelles de colza. Elles vous permettront de détecter l'arrivée des principaux ravageurs du colza dont les charançons (tige colza, siliques) et les méligrèthes.

Placer la cuvette à 10 m de la bordure. La remplir d'eau associée à un mouillant (type liquide vaisselle) pour faciliter les captures.

Remonter la cuvette en cours de culture afin que le fond de la cuvette soit toujours positionné au-dessus de la végétation.

Plus de détails sur le site de Terres-inovia. « [La cuvette jaune le piège incontournable](#) ». [Cliquez-ici](#)

**L'OAD de Terres-INOVIA : prédition des vols de ravageurs.**

L'outil permet d'informer sur la probabilité statistique de capture en cuvette, notamment du **charançon de la tige du colza**. Pour l'utiliser, [cliquez-ici](#) ou sur l'icône à droite



Il permet de visualiser :

- Sous forme graphique : l'évolution de la probabilité journalière de capture jusqu'à J+7, pour une commune donnée.
- Sous forme de carte : les niveaux de probabilité sur tout le territoire, pour une date donnée (jusqu'à J+7).

Les informations prédictives par l'outil viennent en **complément du BSV**. Elles ne tiennent pas compte des spécificités parcellaires et ne dispensent pas de l'observation au champ.

Données météo

[Retour sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C janvier (Normales)	Températures moyennes en °C 1-9 février (Normales)	Précipitations Cumul en mm janvier (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-9 février (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	6.7 (6.2)	8.7 (6.5)	118.8 (66.6)	35.5 (51.6)
	Miniac-Morvan	6.7 (6.2)	8.7 (6.5)	100 (66.6)	47 (51.6)
	Langon	6.3 (6.2)	8.4 (6.5)	174.6 (66.6)	48 (51.6)
Finistère	Brest	7.1 (7.1)	9.1 (7.1)	317.4 (142.6)	51.1 (118.7)
	Landivisiau	6.9 (7.1)	8.8 (7.1)	252.2 (142.6)	37.9 (118.7)
	Quimper	7.3 (7.1)	9.2 (7.1)	351 (142.6)	88 (118.7)
Morbihan	St-Avé	7.1 (6.8)	9.2 (7.1)	156.6 (109)	61.4 (82.5)
	Neulliac	6.4 (6.8)	9.7 (7.1)	259.6 (109)	86.6 (82.5)
	Taupont	7.2 (6.8)	9.6 (7.1)	167.7 (109)	65.2 (82.5)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	6.8 (6.3)	8.6 (6.5)	150 (74.2)	38.4 (64.5)
	Louargat	5.8 (6.3)	7.9 (6.5)	182.2 (74.2)	45.8 (64.5)
	St Glen	6.3 (6.3)	8.2 (6.5)	206.6 (74.2)	69.2 (64.5)

Données météo, du 1^{er} janvier et le 9 février 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Commentaire : Un mois de janvier largement excédentaire en précipitation et avec des températures légèrement au-dessus des normales de saison. Ce début février démarre sous la pluie et la douceur.


Dans les jours à venir, les précipitations et la douceur vont se maintenir. Une baisse des températures est attendue uniquement ce week-end avant le redoux.

Colza


Stades

21 parcelles ont été suivies pour la période du 05/02 au 10/02 (semaine 7).

Elles sont majoritairement au stade C1 - reprise de végétation.



Carte 1 : Stades du colza observés entre 05/02 et le 10/02 (semaine 7).



Graphique 1 : stades des parcelles de colza du réseau.


[Retour sommaire](#)


Le charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)


- Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb pièges suivis	Nb parcelles dans la période de risque (C2-E)	nb pièges avec présence
Du 05/02 au 10/02	9	5	0

Résultats des piégeages : Le charançon de la tige du colza n'a pas été capturé cette semaine.



Carte 2 : Captures du charançon de la tige du colza observées entre le 05/02 et le 10/02 (semaine 7).



Graphique 2 : Dynamique de capture du charançon de la tige du colza.

- Analyse de risque et prévisions

Aucun charançon n'a été capturé cette semaine. D'ici la semaine prochaine, la majorité des parcelles sera dans la période de risque. Bien que les températures soient globalement favorables au vol du charançon (>9°C en moyenne), les épisodes de vents et de pluies devraient perturber son activité.

Risque global :



- Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du stade C2 (entre-nœuds visibles) à E (boutons séparés)



La gestion du risque doit se faire uniquement si le ravageur a été détecté par l'intermédiaire de la cuvette jaune et/ou par les symptômes qu'il provoque (déformation/éclatement de la tige Cf photo).



Si la présence du ravageur est avérée, sa gestion doit se faire au début de l'élongation de la tige, 8 jours après des vols significatifs.

Pour vous aider dans la gestion du risque, un Outil d'Aide à la Décision (OAD), a été créé par Terres Inovia. Il permet de vérifier si un vol va se déclencher près de votre commune. Cliquez sur l'icône à droite ou retrouver l'OAD sur le site de Terres-inovia.


[Retour sommaire](#)


- **Informations sur le ravageur**

Il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza avec celui de la tige du chou, ce dernier n'étant pas impactant pour la culture. Plus de détails dans [le BSV n° 3 du 25 février 2025](#)



Le charançon de la tige du colza est à différencier du charançon de la tige du chou qui est considéré comme peu ou pas nuisible pour le colza.



Les deux insectes s'observent du stade C2 (entre-nœuds visibles) à E (boutons séparés). Leur vol se déclenche lorsque les températures sont >9° C.

Description:

- Le charançon de la tige du colza a le bout des pattes noir (photo du haut).
- Le charançon de la tige du chou, plus petit, a le bout des pattes roux et une tache blanchâtre dorsale entre le thorax et l'abdomen (photo du bas).

Pour bien faire la distinction des deux charançons, il faut les récupérer du piège jaune et les laisser sécher !! Le séchage permettra de mieux faire ressortir la couleur du bout des pattes.

Plus de détails sur le ravageur, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. [Fiche charançon tige colza.](#) (Textes et photos. Source : Terres Inovia).

Autres signalements

De la pseudocercosporellose a été observée sur 5% des plantes dans deux parcelles en Ille-et-Vilaine. Il a également été observé du mycosphaerella sur ces deux parcelles.



Phoma, mycosphaerella, cylindrosporiose, pseudocercosporellose, alternaria. Ne les confondez plus !

[Retour sommaire](#)



Les symptômes foliaires du phoma (photo 1) se caractérisent par des macules arrondies gris cendré, portant des ponctuations régulières noires très caractéristiques (pycnides).

Pour le mycosphaerella (photo 2), les taches sont brunes et entourées d'un halo jaune. On peut voir des anneaux qui se dessinent à partir du centre de la tache.

La cylindrosporiose (photo 3). Symptôme de type brûture, correspondant à des taches beige légèrement parcheminées, entourées de pustules blanches.

Les taches de la pseudocercosporellose (photo 4) sont brunes mais bordées d'un liseré plus sombre.

Enfin l'alternaria (photo 5) se caractérise par de petites taches arrondies noires et avec un halo jaune.

L'observation de ces maladies est à faire sur les feuilles du tiers supérieur du colza. Jamais sur les feuilles sénescentes. (Source terres inovia : [Diagnostiquer les maladies foliaires sur colza -cliquez ici](#)).



Photo 1.
Phoma



Photo 2.
Mycosphaerella



Photo 3.
Cylindrosporiose



Photo 4.
Pseudocercosporella




Photo 5.
Alternaria

Hernie des crucifères

La hernie des crucifères, maladie racinaire, provoque des renflements ou galles du système racinaire du colza et de nombreuses crucifères dès l'automne. L'arrachage de pieds permet d'observer ces symptômes racinaires.

Ces hypertrophies sont de forme et de grosseur variables. Les galles sont d'abord fermes (intérieur plein) et blanches, puis brunissent et se craquellent, puis pourrissent. La dégradation du système racinaire entraîne la mort de la plante dans la majorité des cas. Les symptômes observés sur les parties aériennes vont du flétrissement temporaire du feuillage, au cours de chaudes journées, à un défaut de croissance et à un rougissement des plantes infectées. Avant l'apparition des symptômes sur feuilles, la maladie peut déjà avoir progressé considérablement dans les racines.

(Source texte et photo : Terres-Inovia).



- **Les facteurs favorables sont :**

- Des sols limoneux à pH acide, hydromorphe et battant ;
- Des températures comprises entre 20-25°C et une humidité relative du sol supérieure à 80%. Les forts orages et l'irrigation sont des facteurs aggravants en cas de présence de hernie ;
- Le retour fréquent du colza dans la rotation mais aussi l'implantation de crucifères comme CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) ;
- Un mauvais désherbage, notamment des crucifères, et le maintien des repousses de colza après la récolte ;
- D'autres facteurs favorisent également le développement de la maladie : semis précoce, mauvais drainage de la parcelle ou l'absence de chaulage pour les sols acides ;

Attention à la dissémination de la hernie ! Les outils de travail du sol souillés dans une parcelle infestée sont des vecteurs potentiels de la hernie, tout comme des végétaux contaminés, de l'eau d'irrigation ou des fumiers contaminés. (Source texte : Terres-Inovia).

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. [Fiche hernie des crucifères](#).

Dans le BSV de cette semaine, aucun cas n'a été recensé. Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, n'hésitez pas à remonter l'information en remplissant l'enquête menée par Terres-Inovia ci-dessous. [Enquête Hernie](#)

PROCHAIN BSV : LE 17 FEVRIER 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
AGRIAL, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, EUREDEN, FREDON BRETAGNE.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 41

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :
La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>
La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>
La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : contactez par mail l'animateur Grandes Cultures Mail : Damien.leclercq@fredon-bretagne.com
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail](#).