

Sommaire

[Données météo](#) P2

[Colza](#) P2/P4

[Blé et orge](#) P5/P7

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

	Indicateurs de risque	L'essentiel
Stades du colza : Les parcelles sont majoritairement au stade E : boutons séparés. Les stades observés sont ceux des variétés d'intérêt. Les variétés à floraison précoce qui y sont associées ne sont et ne doivent pas être prises en compte.		
Charançon de la tige du colza		Poursuite du vol. Le pic de vol semble être passé. A surveiller.
Risque colza sain		Les méligèthes sont toujours présents dans les parcelles. Le risque est à estimer en fonction de l'état sanitaire de la culture, du stade du colza et de la présence plus ou moins significative des méligèthes. Il est impératif d'évaluer sa parcelle.
Méligèthe		
Risque colza fragile		
Autres observations sur le colza : Des éclatements de tige peuvent être observés dans les parcelles. Cela est dû à une croissance trop rapide de la culture.		
Blé et orge : Les deux cultures sont majoritairement en fin tallage. Les parcelles les plus avancées sont déjà à épi 1cm, voire dépassé, en particulier en semis précoce et au vu des remontées exceptionnelles des températures.		
Piétin-verse		Comment bien l'identifier et gérer son risque parcellaire.
Autres observations sur les céréales : Des symptômes de rouille jaune ont été signalés sur une variété sensible (Campésino) semée mi-octobre.		
Annexes : Gestion des adventices en sortie hiver : le désherbage mécanique.		

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTU REGLEMENTAIRE : la floraison démarre et les abeilles butinent. Protégeons-les !!

La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs.

[Pour plus de détails sur ce changement pour les applications durant la floraison, cliquez-ici](#)



ACTU BIODIVERSITE:

Ces notes Biodiversité mettent en avant les pratiques agricoles concourant au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité.



Données météo

[Retour sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C février (Normales)	Températures moyennes en °C 1-10 mars (Normales)	Précipitations Cumul en mm février (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-10 mars (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	9.9 (6.5)	10.2 (8.8)	104.0 (51.6)	11.7 (48.9)
	Miniac-Morvan	9.9 (6.5)	11 (8.8)	163.8 (51.6)	5.6 (48.9)
	Langon	9.7 (6.5)	11.2 (8.8)	158.8 (51.6)	16.6 (48.9)
Finistère	Brest	9.9 (7.1)	11.3 (8.9)	201.8 (118.7)	12 (82.2)
	Landivisiau	9.6 (7.1)	11.1 (8.9)	165.4 (118.7)	19.6 (82.2)
	Quimper	10.1 (7.1)	11.2 (8.9)	244.9 (118.7)	5.2 (82.2)
Morbihan	St-Avé	9.9 (7.1)	12.1 (8.8)	164.6 (82.5)	3.4 (66.2)
	Neulliac	9.8 (7.1)	10.7 (8.8)	196.4 (82.5)	10.6 (66.2)
	Taupont	10.3 (7.1)	11.8 (8.8)	136.2 (82.5)	12.4 (66.2)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	9.8 (6.5)	10.9 (8.0)	130.4 (64.5)	7.8 (53.3)
	Louargat	8.9 (6.5)	11 (8.0)	130.8 (64.5)	6.6 (53.3)
	St Glen	9.4 (6.5)	10.6 (8.0)	168.2 (64.5)	8.8 (53.3)

Données météo, du 1^{er} mars au 10 mars 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.



Commentaire : Un mois de février très excédentaire en pluie et bien au-dessus des normales de températures. Une baisse des températures est attendue pour les prochains jours ainsi qu'un épisode pluvieux pour la fin de semaine. Les conditions climatiques restent tout de même favorables au développement des cultures.

Colza

Stades

31 parcelles ont été suivies pour la période du 05/03 au 10/03 (semaine 11).

Elles sont majoritairement au stade E : boutons séparés.



Carte 1 : Stades du colza observés entre 05/03 et le 10/03 (semaine 11).

Graphique 1 : stades des parcelles de colza du réseau.

[Retour sommaire](#)


Le méléigèthe (*Meligethes aeneus*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Les observations sont faites sur le colza d'intérêt et non sur la variété à floraison précoce qui lui a été associée.

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles stades D1-D2 et infestées	% moyen de plantes infestées	Nb moyen de méléigèthes /plante	Nb parcelles stades E et infestées	% moyen de plantes infestées	Nb moyen de Méléigèthes /plante
Du 05/03 au 10/03	22	3	95	6	21	69	4
Du 26/02 au 03/03	29	18	62	10	8	67	4

• Analyse de risque et prévisions

Le méléigèthe est toujours aussi présent dans les parcelles que la semaine dernière au vu des conditions climatiques de ces derniers jours (températures douces et journées ensoleillées).

Le risque est à estimer en fonction de l'état sanitaire de la culture, du stade du colza et de la présence plus ou moins significative des méléigèthes.

Pour les colzas stressés, le seuil est dépassé.

Pour les colzas sains, le risque est modéré notamment dès l'apparition des premières fleurs.

Si infestation significative et colza sain. Risque :  **moyen.**

Si infestation significative et colza fragile. Risque :  **fort**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Le risque est à évaluer sur le colza d'intérêt au cœur de la parcelle, en prenant en compte son état, son stade et le niveau d'infestation. **Une fois les premières fleurs ouvertes il n'y a plus de risque.**

Etat du colza	Stade D1 (boutons accolés)	Stade E (boutons séparés)
Colza sain et vigoureux, conditions pédo-climatiques favorables aux compensations	Aucun risque	6 - 9 méléigèthes/ plante*
Colza peu développé et/ou situé en conditions défavorables aux compensations (parcelles ou zones hydromorphes, peuplement trop faible ou trop important, vigueur faible des plantes,).	50% de plantes infestées ou 1 méléigèthe/plante*	65% à 75% de plantes infestées ou 2 - 3 méléigèthes/ plante*

*Le comptage en bordure n'est pas représentatif de la situation, tout comme le dénombrement des méléigèthes piégés dans la cuvette jaune. Ces deux observations ne sont que des indicateurs permettant de détecter l'arrivée du ravageur dans la parcelle. (Textes et photos. Source : Terres Inovia).



Photo : méléigèthes sur boutons (Stade E)



Photo : boutons avortés suite attaque méléigèthe

• Informations sur le ravageur

Le méléigèthe est un petit coléoptère de couleur noir brillant. La période à risque pour le colza est du stade D1 (boutons accolés cachés) à E (boutons séparés) car le ravageur va percer les boutons floraux pour se nourrir du nectar (cf. photo à droite). Il est en général peu nuisible. Leur vol se déclenche lorsque les températures sont >14° C.

A partir de la floraison, il n'est plus considéré comme un ravageur mais comme un pollinisateur. (Texte et photo. Source : Terres Inovia).

Pour plus de détails sur le ravageur, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. [Fiche méléigèthe](#)




Le charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)


Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb pièges suivis	Nb parcelles dans la période de risque (C2-E)	Nb pièges avec présence
Du 05/03 au 10/03	22	22	8
Du 26/02 au 03/03	29	29	13

Résultats des piégeages : Le charançon de la tige du colza a été capturé dans huit parcelles, principalement dans les zones sud de la région.



Carte 2 : Captures du charançon de la tige du colza observées entre le 05/03 et le 10/03 (semaine 11).



Graphique 2 : Dynamique de capture du charançon de la tige du colza.

Analyse de risque et prévisions

Le vol du charançon de la tige du colza s'est poursuivi cette semaine au vu des conditions climatiques (hausse des températures). Mais le pic de vol semble être passé. A surveiller dans les prochains jours.

Les piégeages sont toujours principalement observés dans le Sud de la région.

Risque global :  **faible à moyen**

Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du stade C2 (entre-nœuds visibles) à E (boutons séparés)



La gestion du risque doit se faire uniquement si le ravageur a été détecté par l'intermédiaire de la cuvette jaune et/ou par les symptômes qu'il provoque (déformation/éclatement de la tige-cf photo).

Si la présence du ravageur est avérée, sa gestion doit se faire au début de l'élongation de la tige, 8 jours après des vols significatifs.

Pour vous aider dans la gestion du risque, un Outil d'Aide à la Décision (OAD), a été créé par Terres Inovia. Il permet de vérifier si un vol va se déclencher près de votre commune. Cliquez sur l'icône à droite ou retrouvez l'OAD sur le site de Terres-inovia.



Informations sur le ravageur


Il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza avec celui de la tige du chou, ce dernier n'étant impactant pour la culture. Plus de détails dans [le BSV n° 3 du 25 février 2025](#)

Blé tendre d'hiver


[Retour](#)
[sommaire](#)


Stades

25 parcelles de blé tendre d'hiver ont été observées entre le 05 mars et le 10 mars 2026. Les parcelles sont majoritairement en fin tallage. La hauteur moyenne de l'épi est de 1 cm.



Carte 4 : Stades du blé tendre d'hiver observés entre 05/03 et le 10/03 (semaine 11).




Graphique 3 : stades des parcelles de blé tendre d'hiver


Orge d'hiver

Stades

23 parcelles d'orge d'hiver ont été observées entre le 05 mars et le 10 mars 2026. Les parcelles sont majoritairement en fin tallage. La hauteur moyenne de l'épi est de 8.7 mm.



Carte 5 : Stades de l'orge d'hiver observés entre 05/03 et le 10/03 (semaine 11).



Graphique 4 : stades des parcelles d'orge d'hiver du réseau



Le piétin-verse (*Oculimacula yallundae* ou *O. acuformis*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Le piétin-verse n'a pas été observé cette semaine, dans les parcelles du réseau.

• Gestion de la maladie



La lutte contre cette maladie repose sur 3 critères, la **sensibilité variétale**, le **risque agronomique** et le **risque climatique**. Ils permettent d'avoir une évaluation globale du risque piétin verse dans sa parcelle.

- **La sensibilité variétale est le principal critère.** Pour les parcelles dont la variété a une note CTPS ≥ 5 , il n'y a pas de risque et aucune évaluation globale du risque n'est à prévoir. Si la variété a une note CTPS ≤ 4 , effectuer une analyse globale du risque piétin-verse.

Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

- **Le risque agronomique** tient compte du type de sol et du potentiel infectieux (précédent et travail du sol).
- **Le risque climatique.** Il prend en compte la pluie et les températures journalières à partir de la date de semis.

A noter : en Bretagne, les symptômes sont rarement visibles en début montaison et s'expriment généralement à la fin de la montaison. Il est donc difficile de se baser sur l'observation des tiges pour définir sa stratégie.

Pour évaluer votre risque, vous pouvez utiliser le baromètre maladie d'Arvalis. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône ci-dessous.



• Informations sur la maladie



Le piétin verse est une maladie inféodée à la parcelle, il cause généralement peu de dégâts. Attention toutefois aux attaques très précoces qui peuvent fragiliser la tige et entraîner une verse parasitaire précoce.

La maladie s'observe du stade « épi 1 cm » à 1 nœud et se caractérise par la présence de tache ocellée (elliptique) sur les gaines. Cette dernière est bordée par un liseré brun diffus. Après avoir soulevé successivement les gaines, on peut observer un ou plusieurs points noirs sur la tige correspondant à des amas mycéliens (stromas).



Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident piétin verse](#)

Annexes

[Retour sommaire](#)


Gestion des adventices en sortie hiver : le désherbage mécanique

				
Types d'adventice	Dicotylédones annuelles			
	Graminées annuelles			
	vivaces			
Stade des adventices	Germination			
	Cotylédon			
	1F			
	2F			
	3F à 6 F			
	> 6F			
Types de sol	Sol argileux			
	Limons battants hydromorphes			
	Sables			
	Petites terres à cailloux			
Légende	Efficacité bonne ou passage possible Efficacité moyenne à acceptable Efficacité moyenne à faible ou passage envisageable Efficacité insuffisante ou passage impossible			

PROCHAIN BSV : LE 17 MARS 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
AGRIAL, ARVALIS, CRA BRETAGNE, COOP GARUN-PAYSANNE, EAS, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, HAUTOIS SAS.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 63

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :

La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>

La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : inscrivez-vous sur le site de FREDON Bretagne : [Formulaire d'inscription](#)
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail](#).