

Sommaire

Données météo P2

Colza P2/P4

Orge P5/P7

Blé P8/P10

Annexes P11

	Indicateur de risque	L'essentiel
Colza : Majoritairement au stade « G4 : les dix premières siliques sont bosselées ».		
Charançon des siliques		La présence du charançon des siliques baisse de nouveau. Les parcelles vont progressivement sortir de la période de risque.
Puceron cendré		Toujours peu de colonies d'observées. Pensez à observer la présence d'auxiliaires.
Blé : Majoritairement entre les stades "dernière feuille pointante (DFP) et dernière feuille étalée (DFE)". Les observations maladies sont faites sur des parcelles non traitées.		
Rouille jaune		La rouille jaune continue d'être observée mais les foyers sont assez rares. Les conditions climatiques à venir seront moyennement favorables.
Septoriose Variétés sensibles au stade DFE		Les symptômes sont stables depuis la semaine dernière. Surveillez l'évolution de la maladie, notamment les variétés sensibles.
Rouille brune		1er foyer observé hors réseau BSV.
Orge : Majoritairement au stade dernière feuille étalée. Les observations maladies sont faites sur des parcelles non traitées.		
Rhynchosporiose Variétés sensibles		La rhynchosporiose est toujours peu observée. Les conditions climatiques assez peu favorables à la maladie attention tout de même aux précipitations localisées.
Helminthosporiose Variétés sensibles		Légère hausse des symptômes. Attention aux variétés sensibles. Ne pas confondre avec la réaction d'hypersensibilité à l'oïdium.
Rouille naine		La rouille naine reste peu observée pour le moment.

Légende :



Risque global très faible

Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle




Résistance

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTUS TECHNIQUES : Céréales : différencier taches physiologiques et maladies.

Des marquages sont actuellement observés sur les feuilles de céréales, phénomène assez courant en Bretagne en cette saison, en lien avec les amplitudes thermiques de fin mars / mi-avril. Des taches physiologiques à bien distinguer des symptômes de maladies. [Pour plus d'informations, consultez l'article d'Arvalis en cliquant ici.](#)



ACTU REGLEMENTAIRE :



Le réseau R4P réalisée conjointement par l'INRAE et l'ANSES tient à jour une liste des problèmes de résistances aux produits phytosanitaires. Plus d'informations sur le site internet : [r4p-inra-cliquez ici.](#)

Données météo

[Retour](#)
[sommaire](#)




Stations météo		Températures moyennes en °C mars (Normales)	Températures moyennes en °C 1-29 avril (Normales)	Précipitations Cumul en mm mars (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-29 avril (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	9.1 (8.8)	12.7 (11)	19.7 (48.9)	28.4 (51.2)
	Miniac-Morvan	8.8 (8.8)	12 (11)	33.6 (48.9)	26.8 (51.2)
	Langon	9.6 (8.8)	13 (11)	12.4 (48.9)	36.2 (51.2)
Finistère	Brest	9.4 (8.9)	12.1 (10.1)	23.9 (82.2)	90 (91.8)
	Landivisiau	9.5 (8.9)	11.8 (10.1)	24.1 (82.2)	52.5 (91.8)
	Quimper	9.5 (8.9)	12.8 (10.1)	30.9 (82.2)	103.3 (91.8)
Morbihan	St-Avé	9.9 (8.8)	13.6 (10.7)	15.8 (66.2)	51.8 (67.5)
	Pontivy	9.2 (8.8)	12.9 (10.7)	21.4 (66.2)	64.6 (67.5)
	Taupont	9.6 (8.8)	13.4 (10.7)	22.6 (66.2)	33.2 (67.5)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	8.5 (8.0)	11.2 (9.8)	26.5 (53.3)	29.9 (59.7)
	Louargat	8.4 (8.0)	11.7 (9.8)	23.6 (53.3)	45.2 (59.7)
	St Glen	8.2 (8.0)	11.5 (9.8)	27.6 (53.3)	40.4 (59.7)

Données météo, du 1^{er} mars au 29 avril 2025 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Colza

Stades

30 parcelles ont été suivies entre le 24 avril et le 29 avril 2025 (semaine 18).



Carte 1 : répartition géographique des stades du colza observés pour la semaine .

Graphique 1: stades des parcelles de colza du réseau.


Les colzas sont majoritairement au stade « G4 : les dix premières siliques sont bosselées ».



Charançon des siliques (*Ceutorhynchus obstrictus*)

Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb pièges avec Ch.des siliques.	Nb parcelles dans la période de risque (stade G2) et infestées	Nb moyen de charançon/plante—stade G2
24/04-29/04	22	2	7	0.48
17/04-23/04	26	5	9	0.6



Carte 2 : répartition géographique des observations du charançon des siliques faites entre le 24/04 et 29/04/2025.

Analyse de risque et prévisions

La présence du charançon des siliques baisse de nouveau, les parcelles vont progressivement sortir de la période de risque. **Risque global :** **faible.**

Gestion du risque

La gestion du risque du charançon passe par son observation dans la parcelle.

A partir du stade G2 « formation des 1ères siliques ».

Le seuil d'intervention est de 1 charançon pour 2 plantes à l'intérieur de la parcelle.

Le vol du charançon des siliques s'opère lorsque les températures sont > 15°C.



Si l'arrivée du charançon est significative en bordure de parcelle, sa gestion peut être faite uniquement en bordure sans avoir à intervenir à l'intérieur de la parcelle

Informations sur le ravageur

Plus de détails dans [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) et sur le site de Terres-Inovia : [Charançon des siliques cliquez-ici](#)



Puceron cendré (*Brevicoryne brassicae*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Des colonies ont été observées dans 3 parcelles sur un total de 26 parcelles suivies pour ce ravageur. Les parcelles infestées sont réparties sur la région. Aucune situation à risque n'a été recensée.

• Analyse de risque et prévisions

De rares colonies sont observées, principalement en bordure de parcelle et sans dépassement de seuil.

Risque global :  **faible.**

• Gestion du risque

La gestion du risque puceron passe par l'observation du puceron dans la parcelle mais également par l'observation d'auxiliaires.

Le seuil d'intervention est de 2 colonies par mètre carré.



Des auxiliaires prédateurs de pucerons (syrphes, etc....) sont régulièrement présents dans les parcelles et limitent le développement des colonies.

Il est important de laisser le temps aux auxiliaires de s'installer avant d'envisager une intervention.

Pour plus d'informations sur les auxiliaires, consultez le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [les auxiliaires - cliquez ici](#)

• Informations sur le ravageur

Plus de détails dans [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) et sur le site de Terres-Inovia : [Charançon des siliques cliquez-ici](#)

Autres signalements :

- **Cylindrosporiose** : la maladie a été observée dans 5 parcelles situées dans le Finistère (4) et le Morbihan (1). Les symptômes vont de 5% à 80% des plants touchés.
- **Mycopsharella sur siliques** : il a été observé dans 3 parcelles situées dans le Finistère (2) et les Côtes-d'Armor (1). Les symptômes vont de 5% à 50% de siliques touchées.
- **Pseudocercosporella** : il a été observé dans 2 parcelles situées dans le Finistère (1) et les Côtes-d'Armor (1). Les symptômes vont de 5% à 10% de feuilles touchées.
- **Des larves de cécidomyies sur siliques** ont pu être observées dans 2 parcelles situées en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. Seulement 5% des siliques sont touchées.




Source : terres inovia


Orge d'hiver

[Retour](#)
[sommaire](#)


Stades



Carte 4 : répartition géographique des stades de l'orge d'hiver observés pour la semaine.



Graphique 4 : stades des parcelles d'orge d'hiver du réseau

25 parcelles d'orge d'hiver ont été observées entre le 24 avril et le 29 avril 2025 (semaine 19). Les parcelles sont majoritairement au stade dernière feuille étalée (DFE).

Rhynchosporiose (*Rhynchosporium commune*)

Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Nb parcelles seuil de risque	Infestation Moyenne
24/04-29/04	21	4	0	5%
17/04-23/04	20	6	0	6.9%

Aucune situation n'a dépassé le seuil de risque. La majorité des symptômes observés est sur les F3.

Analyse de risque et prévisions

La rhynchosporiose est toujours peu observée. Les conditions climatiques sont assez peu favorables à la maladie attention tout de même aux précipitations localisées.

Risque sur variétés sensibles : **faible.** **Risque sur variétés résistantes :** **faible.**

Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 1 nœud.

Observer les 3 feuilles supérieures bien étalées (= 60 feuilles) :

- Variétés sensibles (≤ 5) : si plus de 10% des feuilles atteintes
- Variétés moyennement ou peu sensibles (≥ 6) : si plus de 25% des feuilles atteintes



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis-cliquez ici.](#)

Informations sur la maladie

Plus de détails dans [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) ou sur sa fiche maladie sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie de l'orge](#)



Rouille naine (*Puccinia hordei*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Nb parcelles seuil de risque	Infestation Moyenne
24/04-29/04	22	5	0	9%
17/04-23/04	19	2	1	35%

• Analyse de risque et prévisions

La rouille naine reste peu observée pour le moment.

Risque sur variétés sensibles :  faible. Risque sur variétés résistantes :  faible.

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 1 nœud.

Observer les 3 feuilles supérieures bien étalées (= 60 feuilles) :

- **Variétés sensibles (≤ 5)** : si plus de 10% des feuilles atteintes
- **Variétés moyennement ou peu sensibles (> 4)** : si plus de 50% des feuilles atteintes



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails dans [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sur sa fiche maladie sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie de l'orge](#)



Helminthosporiose (*Drechslera teres*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Nb parcelles seuil de risque	Infestation Moyenne
24/04-29/04	21	8	2	17,5%
17/04-23/04	20	11	1	16%

Les parcelles dépassant le seuil de risque sont de variétés résistantes Memento ou en mélanges variétaux. Elles ont respectivement 47% et 30% de feuilles touchées. Les symptômes sont présents sur les F2 et les F3. Elles sont situées dans le Finistère et le Morbihan.

• Analyse de risque et prévisions

Les symptômes sont stables. Les conditions climatiques restent assez favorables à la maladie. Surveillez les variétés sensibles.

Risque sur variétés sensibles :  **moyen.** **Risque sur variétés résistantes :**  **faible.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 1 nœud.

Observer les 3 feuilles supérieures bien étalées (= 60 feuilles) :

- Variétés sensibles (≤ 5) : si plus de 10% des feuilles atteintes
- Variétés moyennement ou peu sensibles (≥ 6) : si plus de 25% des feuilles atteintes



lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis-cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails dans [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sur sa fiche maladie sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie de l'orge](#)

Autres signalements :

Oïdium : 9 des 22 parcelles observées présentent de l'oïdium. 4 situations ont plus de 30% de feuilles touchées et présentent des symptômes sur les F2.

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie oïdium](#)

En ce moment, il peut être observé des symptômes particuliers dans les parcelles touchées par l'oïdium. Les taches sont brunes sans chlorose avec, non systématiquement, le mycélium d'oïdium en forme d'étoile. Il s'agit en fait d'une réaction d'hypersensibilité à l'oïdium.

A ne pas confondre avec l'helminthosporiose.



Du charbon nu sur orge a été observé dans une parcelle du Morbihan, seuls 2% des épis sont touchés.

Plus d'informations sur la maladie en [cliquant ici : fiche maladie arvalis - charbon nu](#)



De la septoriose sur orge a été observée dans une parcelle d'Ille-et-Vilaine, seules 5% des feuilles sont touchées.


Plus d'informations sur la maladie en [cliquant ici : fiche maladie arvalis - septoriose orge](#)




Blé tendre d'hiver

[Retour sommaire](#)


Stades



Carte 3 : répartition géographique des stades du blé tendre d'hiver observés pour la semaine .



Graphique 3 : stades des parcelles de blé tendre d'hiver

53 parcelles de blé tendre d'hiver ont été observées entre le 24 et 29 avril 2025 (semaine 18). Les parcelles sont majoritairement entre les stades “dernière feuille pointante (DFP) et dernière feuille étalée (DFE)” .

La rouille jaune (*Puccinia striiformis*)

Observations issues des parcelles du réseau

Toute les parcelles suivies ont atteint ou dépassé le stade 2 noeuds.

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Infestation Moyenne
24/04-29/04	45	4	5%
17/04-23/04	47	5	5%

Les variétés touchées sont Jeriko et Junior. Les symptômes sont essentiellement observés sur les F3.

Analyse de risque et prévisions

La rouille jaune continue d'être observée mais les foyers sont assez rares. Les conditions climatiques à venir seront moyennement favorables. Il faut surveiller ses parcelles.

Risque global :  **moyen.**

Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : variété sensible et résistante. Seuil de risque atteint dès la présence des premières pustules dans la parcelle.



Pour évaluer votre risque, vous pouvez utiliser le baromètre maladie d'Arvalis. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône ci-dessous.



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

Informations sur la maladie

Plus de détails sur le pathogène, consultez [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) ou sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident rouille jaune](#)



La septoriose (*Zymoseptoria tritici*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Parcelles stade 2 noeuds			Parcelles stade dernière feuille pointante		
		Nb parcelles infestées sur F2	Nb parcelles seuil de risque	Infestation moyenne F2 (%)	Nb parcelles infestées sur F3	Nb parcelles seuil de risque	Infestation moyenne F3 (%)
24/04-29/04	44	1	0	1%	29	7	28%
17/04-23/04	48	8	0	20%	15	5	40%

Pour les parcelles encore au stade 2 noeuds, aucune situation n'a dépassé le seuil de risque.

Pour les parcelles au stade DFE qui ont dépassé le seuil de risque :

- Variétés sensibles : 1 parcelle avec la variété KWS ULTIM (60% des F3).
- Variétés résistantes : 3 parcelles avec les variétés Chevignon (50% F3), SY TRANSITION (50% F3) et KWS SPHERE (50% F3).
- Variétés non précisées : 3 parcelles avec 30% à 70% des F3 sont touchées.

• Analyse de risque et prévisions

Les symptômes sont stables par rapport à la semaine dernière. Restez vigilant notamment en cas de pluies localisées.

Risque variétés sensibles à moyennement sensibles et au stade DFE :  **moyen.**

Autres situations :  **faible.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Le risque est nul avant le stade 2 noeuds. Les observations sont à débiter uniquement à partir de ce stade.

Pour les variétés sensibles (notes CTPS ≤ 5) : Au stade dernière feuille pointante, si plus de 20 des F3 du moment présentent des symptômes.

Pour les variétés peu sensibles à résistantes (notes CTPS ≥ 6) : Au stade dernière feuille pointante, si plus de 50 des F3 du moment présentent des symptômes.



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)



Des produits de biocontrôles existent : à base de soufre (Héliosoufre, Thiovit, Microthiol, Faeton, Flosul, Actiol...). Liste non exhaustive, renseignez-vous sur les efficacités auprès de vos techniciens.



Informations sur la maladie

Plus de détails sur le pathogène, consultez [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) ou sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident septoriose](#)





La rouille brune (*Puccinia recondita*)

• Observations issues des parcelles du réseau

La rouille brune n'a pas été observée dans les parcelles du réseau BSV. Hors réseau elle a été signalée dans des parcelles situées dans le nord des Côtes-d'Armor, sur les variétés sensibles ST Transition et Intensity.

• Analyse de risque et prévisions

La rouille brune n'a pas été observée cette semaine dans le réseau BSV.

Risque sur variétés sensibles :  **faible.** **Risque sur variétés résistantes :**  **faible.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 2 nœuds.

Le seuil indicatif de risque est atteint dès l'apparition des pustules sur l'une des 3 feuilles supérieures.



utte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails sur le pathogène, consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident rouille brune](#)

L'oïdium (*Blumeria graminis*)

• Observations issues des parcelles du réseau

7 parcelles sur 47 observées présentent des symptômes d'oïdium. Moins de 10% des feuilles sont touchées et l'oïdium est uniquement observée sur les F3, ce qui est sans incidence.

• Analyse de risque et prévisions

L'oïdium est peu observée et elle l'est uniquement sur les F3. Ce qui est sans incidence.

Risque sur variétés sensibles :  **faible.** **Risque sur variétés résistantes :**  **faible.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade épi 1 cm. Plus de détails consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails sur le pathogène, consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident oïdium](#)

Autres observations

Du rhizoctone a été observé sur trois parcelles situées en Ile-et-Vilaine et dans le Finistère. Les symptômes vont de 10% à 15% de plants infestés.

Du piétin verse a été observé dans quatre parcelles situées dans le Finistère. Les symptômes vont de 5% à 20% de plants touchés.

Annexes

[Retour
sommaire](#)


Tableaux des sensibilités variétales pour le blé tendre d'hiver et l'orge d'hiver

Caractéristiques des variétés de blé tendre d'hiver								
Variété	Verse	Résistances aux maladies						
		Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Rouille brune	Septoriose tritici	Fusarioses sur épis	Accumulation DON
ACADEMY	7	3	6	7	5	6,5	5	
BACHELOR	6	7	6	7	7	6,5	5	5
BALZAC	5,5	2	8	7	7	7	5,5	5
CAMPESINO	6	6	6	3	8	6,5	5	6
CELEBRITY	6,5	2	8	6	4	5	4	4
CHEVIGNON	6	3	6	7	6	6,5	5	5
COMPLICE	5	3	6	5	5	5,5	5	3,5
FABULOR	5,5	5	5	6	6	7,5	5,5	
GARFIELD	6	3	7	6	7	7	5	5,5
GERRY	6,5	6	4	5	4	6	4,5	4,5
GODZILLA	4,5	5	5	7	7	7,5	5,5	
GRAVELINE	6	6	8	8	7	7	4,5	
INTENSITY	6,5	6	6	8	5	6,5	5,5	
JERIKO	6,5	3	7	7	7	7	6,5	
JUNIOR	6,5	7	7	7	6	7	5	4
KINGKONG	5,5	3	9	7	5	6,5	5,5	
KWS ASTRUM	6,5	4	8	8	6	7	5	
KWS ERRUPTIUM	6	3	7	8	6	7	5,5	
KWS ETOILE	6,5	6	8	7	4	6	5	
KWS EXTASE	7	3	7	7	6	6,5	4	4
KWS PERCEPTION	5,5	2	8	7	6	6,5	6	6
KWS SPHERE	5,5	6	4	7	6	6,5	5,5	6
LG ABSALON	5,5	6	8	6	7	7,5	5	5
LG AUDACE	5,5	6	7	6	5	6	4,5	5
OLAF	6	2	5	7	6	7	5,5	
PONDOR	6,5	5	5	7	4	6,5	5,5	
PRESTANCE	5	6	5	5	6	6,5	4,5	5
RGT FARMEO	5,5	3	7	6	8	7	5	
RGT INDEXO	5,5	3	8	7	8	7,5	5,5	
RGT PACTEO	5,5	2	5	7	5	6,5	5	5
RGT PROPULSO	5,5	3	6	8	8	5,5	5	
RUBISKO	6,5	2	6	6	7	5	5	5
SHREK	6,5	3	5	8	6	8	5	4,5
SU ADDICTION	7	3	7	7	3	6,5	4,5	4
SU HYLORD	3,5	5	6	7	3	7	5	
SU HYREAL	5	6	5	5	5	7	5,5	5
SU SAUVIGNON	5,5	7	7	6	5	6,5	4	
SY ADMIRATION	5	6	4	7	5	5	6,5	5,5
SY TRANSITION	6,5	4	7	8	6	6,5	6	
THERMIDOR	6	6	6	7	4	7,5	5	
WINNER	6	3	5	7	7	5,5		4,5

Caractéristiques des variétés d'orge d'hiver 2 rangs et escourgeon							
Variété	Verse	Résistances aux maladies					
		Oïdium *	Rhynchosporiose	Helminthosporiose	Rouille naine *	Ramulariose	Nuisibilité globale maladies (1)
ORGE 6 RANGS							
ALIENOR	5,5	5	(6)	6	7		7
CARROUSEL	5	6	5	6	6	6	6
DEMENTIEL	5,5	6	6	6	5	5	5
ETERNEL	6	6	6	6	5	6	6
FASCINATION	5,5	7	5	6	5	(6)	6
INTEGRAL	6,5	4	6	6	6	6	5
KWS FARO	6	6	5	6	3	5	4
KWS INNOVATRIS	5,5	5	(6)	6	6		6
KWS JAGUAR	5	5	6	6	5	7	5
KWS JOYAU	6	4	6	7	5	7	6
LG ZEBRA	6	8	5	5	6	5	6
LG ZEBULON	6	7	5	6	7	7	6
LG ZORICA	6	6	5	6	6	(6)	6
SY COLYSEOO (h)	5,5	6	(6)	7	6		6
SY DAKOOTA (h)	6	6	6	6	(5)	6	6
SY LOONA (h)	5,5	7	7	6	7	6	6
SY SCOOP (h)	5,5	7	7	7	7	7	6
ORGE 2 RANGS							
Amandine	6	6	7	6	6	5	6
Comtesse	6	7	7	6	6	5	7
Idilic	4,5	6	6	6	6	5	6
KWS Mattis	6,5	6	(5)	6	5		5
KWS Onyis	6,5	6	7	7	6	(6)	6
LG Caiman	5,5	8	4	6	6	5	5
LG Casting	5,5	7	5	6	6	5	6
Majuscule	5	4	5	7	6	(6)	5
Memento	5,5	5	7	6	7	5	6
Noblesse	6,5	8	(6)	6	5	6	6
Organa	5	6	(7)	6	6		6

Résistance aux accidents et aux maladies

- 1- Très sensible
- 2 - Sensible
- 3 - Sensible à assez sensible
- 4 - Assez sensible
- 5 - Assez sensible à peu sensible
- 6 - Peu sensible
- 7 - Assez résistant
- 8 - Assez résistant à résistant
- 9 - Résistant

Source : essais pluriannuels de post-inscription (Arvalis et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

PROCHAIN BSV : MARDI 6 MAI 2025

ABONNEMENT BSV

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :

La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>
 La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne :
<https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>
 La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
 AGRIAL, ARVALIS, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, D2N, EAS, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, GARUN PAYSANNE, GN SOLUTIONS, HAUTOIS, INNOVAL, LE GOUSSANT LYCEE BREHOULOU, TERDICI, TERRES DE L'OUEST,

Direction de Publication
 Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne
 ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES
 Contact : Claire Ricono
 Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 41
Rédigé par :
 FREDON Bretagne
 5, Rue A. de St Exupéry
 35235 THORIGNE FOUILLARD
 animateur Grandes Cultures – Damien Leclercq
 Tél : 07 63 57 60 84
Comité de Relecture :
 Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne,
 DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres
 Inovia

Pour recevoir gratuitement les BSV :

Inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : Formulaire pour envoi de mail
 Ou contactez par mail l'animateur Grandes Cultures : Mail : Damien.leclercq@fredon-bretagne.com

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.