

Sommaire

Données météo P2

Blé **P2/P7**

Orge **P8/P11**

Maïs **P12**

Annexes **P13**

		Indicateur de risque	L'essentiel
Blé : majoritairement en cours d'épiaison. Les observations maladies sont faites sur des parcelles non traitées.			
Rouille jaune			La rouille jaune continue d'être observée. Les conditions climatiques restent favorables. Il faut surveiller ses parcelles et vérifier la présence ou non de la maladie.
Septoriose	Variétés sensibles au stade DFE		Les symptômes sont en hausse par rapport à la semaine dernière.
Fusariose des épis			Les parcelles qui sont entrées en floraison doivent être surveillées attentivement. Des orages localisés peuvent apporter un risque.
Rouille brune			Les infestations sont peu fréquentes. Les conditions climatiques seront moyennement favorables à la maladie. Il faut cependant vérifier la présence ou non de la rouille brune.
Puceron des épis			Aucune colonie n'a encore été observée dans le réseau BSV. Pensez à vérifier la présence d'auxiliaires en cas d'infestation.
Orge : majoritairement en cours de floraison. Les observations maladies sont faites sur des parcelles non traitées.			
Rhynchosporiose			La rhynchosporiose est toujours peu observée.
Helminthosporiose	Variétés sensibles		Les symptômes sont stables depuis la semaine dernière. Attention aux variétés sensibles.
Rouille naine	Variétés sensibles		Légère hausse des foyers observés.
Autre : reconnaître la ramulariose ou la septoriose de l'orge.			
Maïs : Plus de la moitié des semis a été réalisée. Quelques préconisations à prendre pour le semis.			

Légende :

	Risque global très faible		Prophylaxie		Résistance
	Risque global très fort		Biocontrôle		

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTU TECHNIQUE : Hernie sur colza - Diagnostiquer et adapter sa variété.

Pour vérifier si votre sol est contaminé par la maladie, faites le test du chou chinois. Ce diagnostic peut être réalisé de début avril jusqu'à fin août.

Pour plus de détails, consultez [le site de Terres Inovia - Diagnostic hernie en cliquant ici](#)

Si le test est positif, penser à implanter une variété résistante. Pour cela rendez-vous sur [le site MyVar en cliquant ici](#)

ACTU REGLEMENTAIRE :



Le réseau R4P réalisée conjointement par l'INRAE et l'ANSES tient à jour une liste des problèmes de résistances aux produits phytosanitaires. Plus d'informations sur le site internet : [r4p-inra -cliquez ici.](#)

Données météo


[Retour](#)
[sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C avril (Normales)	Températures moyennes en °C 1-13 mai (Normales)	Précipitations Cumul en mm avril (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-13 mai (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	12.7 (11)	14.5 (14.3)	28.4 (51.2)	22.4 (58.2)
	Miniac-Morvan	12 (11)	14.3 (14.3)	26.8 (51.2)	3.4 (58.2)
	Langon	13 (11)	15 (14.3)	36.2 (51.2)	32.4 (58.2)
Finistère	Brest	12.1 (10.1)	13 (12.8)	90 (91.8)	68.1 (74.6)
	Landivisiau	11.8 (10.1)	12.7 (12.8)	52.5 (91.8)	35.3 (74.6)
	Quimper	12.8 (10.1)	13.8 (12.8)	103.3 (91.8)	88.9 (74.6)
Morbihan	St-Avé	13.6 (10.7)	15.6 (13.7)	51.8 (67.5)	17.6 (66)
	Pontivy	12.9 (10.7)	13.9 (13.7)	64.6 (67.5)	36 (66)
	Taupont	13.4 (10.7)	14.6 (13.7)	33.2 (67.5)	14.2 (66)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	11.2 (9.8)	13 (12.5)	29.9 (59.7)	24.4 (50.7)
	Louargat	11.7 (9.8)	12.6 (12.5)	45.2 (59.7)	22 (50.7)
	St Glen	11.5 (9.8)	13 (12.5)	40.4 (59.7)	26.4 (50.7)


Données météo, du 1^{er} avril au 13 mai 2025: source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Blé tendre d'hiver

Stades



Carte 3 : répartition géographique des stades du blé tendre d'hiver observés pour la semaine .



Graphique 3 : stades des parcelles de blé tendre d'hiver

41 parcelles de blé tendre d'hiver ont été observées entre le 8 et 13 mai 2025 (semaine 20). Les parcelles sont majoritairement en cours d'épiaison.



La rouille jaune (*Puccinia striiformis*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Infestation Moyenne
08/05-13/05	38	8	14.8%
02/05-06/05	41	8	12,7%

Les variétés touchées sont CHEVIGNON (2 parcelles), JUNIOR (2), JERIKO (1), BALZAC (1), WINNER (1) et un mélange variétal (LG ABSALON, KWS SPHERE, BALZAC) (1). En moyenne 13% des F3 sont touchées, 35% des F2 et 24% des F1.

• Analyse de risque et prévisions

La rouille jaune continue d'être observée et les foyers sont en hausse. Les conditions climatiques restent favorables. Il faut surveiller ses parcelles et vérifier la présence ou non de la maladie.

Risque global :  **moyen.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Pour les variétés sensibles et résistantes, le seuil de risque atteint dès la présence des premières pustules dans la parcelle.



Pour évaluer votre risque, vous pouvez utiliser le baromètre maladies d'Arvalis. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône ci-dessous.



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis-cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails, consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident rouille jaune](#)

La rouille brune (*Puccinia recondita*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Infestation Moyenne
08/05-13/05	38	4	16,4%
02/05-06/05	40	4	18.6%

Les variétés touchées sont CHEVIGNON (10% F3 et 10% F2), KWS EXTASE (50% F3 et 10% F2) ainsi qu'une situation en mélange variétal (20% F3 touchées et 5% F2).

• Analyse de risque et prévisions

La situation est similaire à la semaine précédente, les infestations sont assez peu fréquentes. Les conditions climatiques resteront moyennement favorables à la maladie. Il faut cependant observer les parcelles pour vérifier la présence ou non de la rouille brune. **Risque global**  **faible à moyen**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 2 nœuds.

Le seuil indicatif de risque est atteint dès l'apparition des pustules sur l'une des 3 feuilles supérieures.



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis-cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails, consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident rouille brune](#)



La fusariose des épis (*Fusarium spp*, *Microdochium spp*)

• Analyse de risque et prévisions

Les parcelles qui sont entrées en floraison doivent être surveillées attentivement. Des orages localisés peuvent apporter un risque. La situation est à évaluer grâce à la grille de risque ci-dessous.

• Gestion du risque

A l'approche de la floraison, un risque de contamination par la fusariose des épis est possible. La gestion du risque fusariose se fait notamment par une évaluation du risque d'accumulation en DON (cf. grille ci-dessous).

Grille d'évaluation du risque d'accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain de blé tendre.

Les situations les plus à risque sont : les précédents maïs et sorgho, les parcelles non labourées (avec résidus en surface) et les variétés sensibles. Le risque est important en cas de précipitation dès le stade début de la floraison (critère déterminant). La vigilance est de mise à partir de la sortie des étamines pour les parcelles de blé de la région.

La grille estime le risque de 1 (risque DON le plus faible), à 7 (risque DON le plus fort).

Une variété est dite sensible si sa note d'accumulation en DON est inférieure ou égale à 3.5, elle est dite peu sensible si cette note est supérieure à 5.5.

Pour vérifier la note d'accumulation de votre variété : [Tableau des sensibilités variétales](#) en annexe ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

La grille est également adaptée pour le triticale.

Gestion des résidus*		Sensibilité variétale	Risque	Pluie (mm) autour de la floraison (+/- 7 jours)		
				<10	10-40	>40
	Céréales à paille, colza, lin, pois, féverole, tournesol	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	1		
			Moyennement sensibles			
			Sensibles	3		T
		Techniques sans labour ou résidus en surface	Peu sensibles	2		
			Moyennement sensibles			
			Sensibles	3		T
	Betteraves, pomme de terre, soja, autres	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	2		
			Moyennement sensibles			
			Sensibles	3		T
		Techniques sans labour ou résidus en surface	Peu sensibles	2		
			Moyennement sensibles			
			Sensibles	4	T	T
	Maïs et sorgho fourrages	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	2		
			Moyennement sensibles			
			Sensibles	4		
		Techniques sans labour ou résidus en surface	Peu sensibles		T	T
			Moyennement sensibles	5	T	T
			Sensibles	6	T	T
	Maïs et sorgho grains	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	2		
			Moyennement sensibles	3		T
			Sensibles	4	T	T
		Techniques sans labour ou résidus en surface	Peu sensibles	5	T	T
			Moyennement sensibles	6	T	T
			Sensibles	7	T	T

• Informations sur la maladie



La maladie est responsable de la production de mycotoxines dans les grains, dont les déoxynivalénol (DON).

Les conditions climatiques sont les principales causes d'apparition de la maladie. Les *Fusarium* sont favorisés par une forte humidité ou une période pluvieuse persistante pendant plusieurs jours entre la période épiaison-début floraison. Un court épisode pluvieux à la floraison, précédé d'une période sèche n'est pas suffisant pour l'installation de la maladie.



Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident fusariose des épis.](#) (Textes et photos. Source Arvalis).



La septoriose (*Zymoseptoria tritici*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infestées sur F3	Nb parcelles seuil de risque	Infestation moyenne F3 (%)
08/05-13/05	39	30	12	50%
02/05-06/05	40	24	7	33%

- **Variétés sensibles** : 2 parcelles avec la variété KWS ULTIM (90% des F3, 70% des F2 et 50% des F1), SY ADMIRATION (50% des F3).
- **Variétés résistantes** : 8 parcelles avec les variétés CHEVIGNON (65% à 90% des F3, 20% à 60% des F2, 5% des F1), JERIKJO (90% F3, 20% F2), INTENSITY (80% F3), KWS EXTASE (40% F2, 80% des F3), BALZAC (100% F3)
- **Mélanges variétaux** : 1 parcelle avec 80% des F3 touchées et 20% des F2.
- **Variétés non précisées** : 1 parcelle avec 50% des F3 sont touchées et 20% des F2.

• Analyse de risque et prévisions

Les symptômes sont en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Les conditions climatiques à venir resteront favorables à la maladie.

Risque variétés sensibles à moyennement sensibles et au stade DFE :  **moyen à fort**

Autres situations :  **faible.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Le risque est nul avant le stade 2 nœuds. Les observations sont à débiter uniquement à partir de ce stade.

Pour les variétés sensibles (notes CTPS ≤ 5) : Au stade dernière feuille pointante, si plus de 20 des F3 du moment présentent des symptômes.

Pour les variétés peu sensibles à résistantes (notes CTPS ≥ 6) : Au stade dernière feuille pointante, si plus de 50 des F3 du moment présentent des symptômes.



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie



Plus de détails, consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident septoriose](#)



Le puceron de l'épi (*Sitobion avenae*)

- **Observations issues des parcelles du réseau**

Aucune colonie n'a été observée dans le réseau BSV.

- **Analyse de risque et prévisions**

Aucune colonie n'a été observée dans le réseau BSV. **Risque global**  **faible.**

- **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade épiaison.

1 épi sur 2 infesté par au moins un puceron. Ce seuil correspond en moyenne à moins de 5 pucerons/épi.



Des auxiliaires prédateurs de pucerons (syrphes, etc....) sont régulièrement présents dans les parcelles et limitent le développement des colonies.

Il est important de laisser le temps aux auxiliaires de s'installer avant d'envisager une intervention.

Pour plus d'informations sur les auxiliaires, consultez le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [les auxiliaires - cliquez ici](#)

Coccinelle
(adulte et larve)



Syrphe
(adulte et larve)



Chrysopes
(adulte et larve)



Micro-hyménoptère
(adulte et puceron parasité)



- **Informations sur le ravageur**



Seul le puceron *Sitobion avenae* est présent sur les épis. Il développe des colonies qui provoquent des dégâts par prélèvement de sève de la floraison à grain laiteux-pâteux. Au-delà, les populations régressent.

Les pucerons se développent souvent en foyers, fruit d'un séjour de longue durée des pucerons. Il est donc indispensable de parcourir la parcelle si l'on veut connaître précisément le niveau d'infestation.

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident puceron de l'épi.](#) (Textes et photos. Source Arvalis).





L'oïdium (*Blumeria graminis*)

- **Observations issues des parcelles du réseau**

5 parcelles sur 37 observées présentent des symptômes d'oïdium. Les variétés touchées sont KWS SPHERE (30% des F3 touchées et 20% des F2), LG ABSALON (25% des F3 et 15% des F2) et JUNIOR (45% des F3 et 25% des F2).

- **Analyse de risque et prévisions**

L'oïdium reste peu observée. Pour les parcelles infestées, il faut faire attention à ce qu'elle ne monte pas sur les épis.

Risque sur variétés sensibles :  **faible.** **Risque sur variétés résistantes :**  **faible.**

- **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade épi 1 cm. Plus de détails consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#)

- **Informations sur la maladie**

Plus de détails sur le pathogène, consultez [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident oïdium](#)

Autres observations

Du rhizoctone a été observé sur deux parcelles situées en Ile-et-Vilaine et dans le Finistère. Les symptômes sont de 10% de plants infestés.


Du piétin verse a été observé dans cinq parcelles réparties entre le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Les symptômes vont de 2% à 20% de plants touchés.

Le criocère ou lemas est observé dans plusieurs parcelles. Les dégâts vont de "traces présentes (1%) à quelques dégâts (<20%)". Pour plus de détails sur le ravageur, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche accident criocère](#)


Orge d'hiver

[Retour
sommaire](#)


Stades



Carte 4 : répartition géographique des stades de l'orge d'hiver observés pour la semaine.



Graphique 4 : stades des parcelles d'orge d'hiver du réseau

21 parcelles d'orge d'hiver ont été observées entre le 8 et 13 mai 2025 (semaine 20). Les parcelles sont majoritairement en cours de floraison.

Rhynchosporiose (*Rhynchosporium commune*)

Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Nb parcelles seuil de risque	Infestation Moyenne
08/05-13/05	19	8	1	19%
02/05-06/05	18	4	0	10%

Une parcelle avec la variété sensible LG ZORICA a dépassé le seuil de risque, elle est située en Ile-et-Vilaine. Les symptômes sont présents sur 20% des F1, 70% des F2 et 40% des F3.

Analyse de risque et prévisions

Une hausse des symptômes est observée cette semaine. Les conditions climatiques sont moyennement favorables à la maladie.

Risque sur variétés sensibles : **faible.** **Risque sur variétés résistantes :** **faible.**

Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 1 nœud.

Observer les 3 feuilles supérieures bien étalées (= 60 feuilles) :

- Variétés sensibles (note CTPS ≤ 5) : si plus de 10% des feuilles atteintes
- Variétés moyennement ou peu sensibles (note CTPS ≥ 6) : si plus de 25% des feuilles atteintes



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis-cliquez ici.](#)

Informations sur la maladie

Plus de détails dans [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) ou sur sa fiche maladie sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie de l'orge](#)



Rouille naine (*Puccinia hordei*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Nb parcelles seuil de risque	Infestation Moyenne
08/05-13/05	19	4	1	38%
02/05-06/05	17	2	1	33%

La parcelle qui a dépassé le seuil de risque est située dans le Finistère. La variété KWS MATTIS, sensible, a 90% des F3, F2 et F1 touchées.

• Analyse de risque et prévisions

Légère hausse des foyers de rouille naine.

Risque sur variétés sensibles :  **faible à moyen** **Risque sur variétés résistantes :**  **faible.**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 1 nœud.

Observer les 3 feuilles supérieures bien étalées (= 60 feuilles) :

- **Variétés sensibles (note CTPS ≤ 5) :** si plus de 10% des feuilles atteintes
- **Variétés moyennement ou peu sensibles (note CTPS >4) :** si plus de 50% des feuilles atteintes



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

• Informations sur la maladie

Plus de détails dans [le BSV n° 9 du 8 avril 2025](#) ou sur sa fiche maladie sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie de l'orge](#)



Helminthosporiose (*Drechslera teres*)

Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles infectées	Nb parcelles seuil de risque	Infestation Moyenne
08/05-13/05	19	15	4	25%
02/05-06/05	17	11	7	23%

Pour les parcelles qui ont dépassé le seuil de risque :

- Variétés sensibles : 1 parcelle avec la variété LG ZEBRA (70% des F3, 35% des F2).
- Variétés résistantes : 3 parcelles avec les variétés MEMENTO (100%-70% F3, 70%-30% F2, 25% des F1) et LG ZEBULON (70% des F3, 10% des F2)

Analyse de risque et prévisions

Les symptômes sont stables depuis la semaine dernière. Les conditions climatiques restent favorables à la maladie. Surveillez les variétés sensibles.

Risque sur variétés sensibles :



moyen.

Risque sur variétés résistantes :



faible.

Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque : A partir du stade 1 nœud.

Observer les 3 feuilles supérieures bien étalées (= 60 feuilles) :

- Variétés sensibles (note CTPS ≤ 5) : si plus de 10% des feuilles atteintes
- Variétés moyennement ou peu sensibles (note CTPS ≥ 6) : si plus de 25% des feuilles atteintes



La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale. Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

Informations sur la maladie

Plus de détails dans [le BSV n°9 du 8 avril 2025](#) ou sur sa fiche maladie sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie de l'orge](#)

Autres signalements :

Oïdium : 5 des 19 parcelles observées présentent de l'oïdium. Elles ont toutes plus de 10% de feuilles touchées. Une parcelle, avec la variété MEMENTO, a plus de 50% des feuilles touchées.

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie oïdium](#)

Du charbon nu sur orge a été observé dans une parcelle d'Ille-et-Vilaine, seuls 2% des épis sont touchés.

Plus d'informations sur la maladie en [cliquant ici : fiche maladie arvalis - charbon nu](#)



Grillure pollinique

Ce type de symptôme a été observé dans une parcelle d'Ille-et-Vilaine et sur 2% des feuilles.

Plus d'informations sur le symptôme : [fiche accident Arvalis grillure pollinique—cliquez-ici](#)





Ramulariose (*Ramularia collo-cygni*)

- Observations issues des parcelles du réseau

La maladie a été observée dans trois parcelles.

- Analyse de risque et prévisions



Une fois la maladie déclarée au stade épiaison, elle ne peut plus être contrôlée.

La lutte contre cette maladie est essentiellement variétale.

Pour vérifier la note CTPS de votre variété : [tableau des sensibilités variétales en annexe](#) ou [consultez les fiches variétés blé tendre sur le site d'Arvalis—cliquez ici.](#)

- Informations sur la maladie



Les premiers symptômes apparaissent généralement **après l'épiaison sur les feuilles supérieures**. Répartition **homogène** dans la parcelle.

Taches brunes rectangulaires, courtes de 2 à 5 mm de long sur 1 à 2 mm de large qui **suivent les nervures**. Elles sont **entourées d'une chlorose (halo chlorotique)**. Les symptômes peuvent être confondus avec des petites taches d'helminthosporiose. Les taches de ramulariose traversent les feuilles et sont **visibles sur les 2 faces**. Les symptômes restent perceptibles sur les feuilles desséchées.



Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis. [Fiche maladie la ramulariose](#)

Septoriose de l'orge

La septoriose de l'orge n'est pas une maladie courante et préjudiciable des cultures d'orge en France.

Cependant suite à une détection de *Parastagonospora avenae f.sp.triticea* signalée en janvier 2016 par les autorités chinoises, espèce de quarantaine en Chine, des actions sont entreprises depuis pour mieux caractériser les espèces en présence et augmenter les mesures de prévention.

Ainsi, la surveillance des symptômes de septoriose de l'orge a été renforcée dans les réseaux d'épidémiosurveillance et les expérimentations.

Merci d'en tenir compte dans les observations et de faire remonter l'information, si nécessaire, au responsable filière céréales à paille régional.



Maïs

[Retour](#)
[sommaire](#)

Plus de la moitié des parcelles a été semée. Pour les parcelles levées les stades vont du pointant à 6 feuilles pour les plus précoces. Quelques rappels pour bien démarrer la campagne :

- **Un sol bien préparé et un bon semis** permettent de limiter les attaques liées aux corvidés, taupins, mouches/géomyze et limaces. Pour rappel, le semis doit se faire dans un sol réchauffé et ressuyé afin de favoriser une levée homogène et de limiter les risques liés aux ravageurs des stades précoce du maïs (semis-3 F).
- **Corvidés** : Les attaques de corvidés sont difficiles à maîtriser, un bon rappuyage des lignes de semis et un semis à profondeur 4-5 cm est recommandé dans les zones à risque. Semer à des dates assez proches des parcelles voisines pour éviter un échelonnage des levées qui est favorable aux attaques de corvidés. Utiliser des effaroucheurs.
- **Pour les taupins, utiliser des plantes appâts pour les détourner du maïs.** Au semis, épandre en plein sur le sol un mélange de grains de blé ou d'orge puis les incorporer dans la couche superficielle sur 10-15 cm de profondeur. Les appâts de blé ou d'orge devront être impérativement détruits lors du désherbage à 3-4 feuilles du maïs.
- Pour les **limaces**, éviter d'avoir un sol trop motteux et la présence de résidus de végétaux en surface.
- **Pour la mouche du semis**, enfouir les résidus et éviter l'incorporation de matières organiques au moment des semis afin d'empêcher une prolifération trop rapide.

Pour chaque dégât occasionné par la faune sauvage, les agriculteurs sont invités à remplir à chaque fois le formulaire de déclaration en ligne (formulaire : [cliquez-ici](#)) ou via une application mobile disponible sur android et apple : [cliquez-ici](#) pour savoir comment les télécharger. Cette déclaration, si elle n'ouvre pas droit à l'indemnisation, permet d'orienter les mesures de gestion de l'espèce et de justifier du maintien du classement en « nuisible ».

Pour plus d'informations sur ces ravageurs, cliquez ci-contre [mouche du semis](#), [taupins](#), [corvidés](#), [limace](#). (Source : Arvalis).

Annexes

Tableaux des sensibilités variétales pour le blé tendre d'hiver et l'orge d'hiver

Caractéristiques des variétés de blé tendre d'hiver								
Variété	Verse	Résistances aux maladies						
		Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Rouille brune	Septoriose tritici	Fusarioses sur épis	Accumulation DON
ACADEMY	7	3	6	7	5	6,5	5	
BACHELOR	6	7	6	7	7	6,5	5	5
BALZAC	5,5	2	8	7	7	7	5,5	5
CAMPESINO	6	6	6	3	8	6,5	5	6
CELEBRITY	6,5	2	8	6	4	5	4	4
CHEVIGNON	6	3	6	7	6	6,5	5	5
COMPLICE	5	3	6	5	5	5,5	5	3,5
FABULOR	5,5	5	5	6	6	7,5	5,5	
GARFIELD	6	3	7	6	7	7	5	5,5
GERRY	6,5	6	4	5	4	6	4,5	4,5
GODZILLA	4,5	5	5	7	7	7,5	5,5	
GRAVELINE	6	6	8	8	7	7	4,5	
INTENSITY	6,5	6	6	8	5	6,5	5,5	
JERIKO	6,5	3	7	7	7	7	6,5	
JUNIOR	6,5	7	7	7	6	7	5	4
KINGKONG	5,5	3	9	7	5	6,5	5,5	
KWS ASTRUM	6,5	4	8	8	6	7	5	
KWS ERRUPTIUM	6	3	7	8	6	7	5,5	
KWS ETOILE	6,5	6	8	7	4	6	5	
KWS EXTASE	7	3	7	7	6	6,5	4	4
KWS PERCEPTIUM	5,5	2	8	7	6	6,5	6	6
KWS SPHERE	5,5	6	4	7	6	6,5	5,5	6
LG ABSALON	5,5	6	8	6	7	7,5	5	5
LG AUDACE	5,5	6	7	6	5	6	4,5	5
OLAF	6	2	5	7	6	7	5,5	
PONDOR	6,5	5	5	7	4	6,5	5,5	
PRESTANCE	5	6	5	5	6	6,5	4,5	5
RGT FARMEO	5,5	3	7	6	8	7	5	
RGT INDEXO	5,5	3	8	7	8	7,5	5,5	
RGT PACTEO	5,5	2	5	7	5	6,5	5	5
RGT PROPULSO	5,5	3	6	8	8	5,5	5	
RUBISKO	6,5	2	6	6	7	5	5	5
SHREK	6,5	3	5	8	6	8	5	4,5
SU ADDICTION	7	3	7	7	3	6,5	4,5	4
SU HYLORD	3,5	5	6	7	3	7	5	
SU HYREAL	5	6	5	5	5	7	5,5	5
SU SAUVIGNON	5,5	7	7	6	5	6,5	4	
SY ADMIRATION	5	6	4	7	5	5	6,5	5,5
SY TRANSITION	6,5	4	7	8	6	6,5	6	
THERMIDOR	6	6	6	7	4	7,5	5	
WINNER	6	3	5	7	7	5,5		4,5

Caractéristiques des variétés d'orge d'hiver 2 rangs et escourgeon							
Variété	Verse	Résistances aux maladies					
		Oïdium *	Rhynchosporiose	Helminthosporiose	Rouille naine *	Ramulariose	Nuisibilité globale maladies (1)
ORGE 6 RANGS							
ALIENOR	5,5	5	(6)	6	7		7
CARROUSEL	5	6	5	6	6	6	6
DEMENTIEL	5,5	6	6	6	5	5	5
ETERNEL	6	6	6	6	5	6	6
FASCINATION	5,5	7	5	6	5	(6)	6
INTEGRAL	6,5	4	6	6	6	6	5
KWS FARO	6	6	5	6	3	5	4
KWS INNOVATRIS	5,5	5	(6)	6	6		6
KWS JAGUAR	5	5	6	6	5	7	5
KWS JOYAU	6	4	6	7	5	7	6
LG ZEBRA	6	8	5	5	6	5	6
LG ZEBULON	6	7	5	6	7	7	6
LG ZORICA	6	6	5	6	6	(6)	6
SY COLYSEOO (h)	5,5	6	(6)	7	6		6
SY DAKOOTA (h)	6	6	6	6	(5)	6	6
SY LOONA (h)	5,5	7	7	6	7	6	6
SY SCOOP (h)	5,5	7	7	7	7	7	6
ORGE 2 RANGS							
Amandine	6	6	7	6	6	5	6
Comtesse	6	7	7	6	6	5	7
Idilic	4,5	6	6	6	6	5	6
KWS Mattis	6,5	6	(5)	6	5		5
KWS Ovnis	6,5	6	7	7	6	(6)	6
LG Caiman	5,5	8	4	6	6	5	5
LG Casting	5,5	7	5	6	6	5	6
Majuscule	5	4	5	7	6	(6)	5
Memento	5,5	5	7	6	7	5	6
Noblesse	6,5	8	(6)	6	5	6	6
Organa	5	6	(7)	6	6		6

Résistance aux accidents et aux maladies

- 1- Très sensible
- 2 - Sensible
- 3 - Sensible à assez sensible
- 4 - Assez sensible
- 5 - Assez sensible à peu sensible
- 6 - Peu sensible
- 7 - Assez résistant
- 8 - Assez résistant à résistant
- 9 - Résistant

Source : essais pluriannuels de post-inscription (Arvalis et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

PROCHAIN BSV : MARDI 20 MAI 2025

ABONNEMENT BSV

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants : La FREDON Bretagne : https://fredon-bretagne.com/ La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : https://bretagne.chambres-agriculture.fr/ La DRAAF Bretagne : https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/		Pour recevoir gratuitement les BSV : Inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : Formulaire pour envoi de mail Ou contactez par mail l'animateur Grandes Cultures - Mail : Damien.leclercq@fredon-bretagne.com	
L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants : AGRIAL, ARVALIS, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, D2N, EAS, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, GARUN PAYSANNE, GN SOLUTIONS, HAUTBOIS, INNOVAL, LE GOUessant LYCEE BREHOULOU, TERDICI, TERRES DE L'OUEST,	Direction de Publication Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES Contact : Claire Ricono Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 41 Rédigé par : FREDON Bretagne 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq Tél : 07 63 57 60 84 Comité de Lecture : Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia	Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques. <i>Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.</i>	