

Sommaire

[Données météo P2](#)

[Maïs](#)

[P2/P4](#)

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

	Indicateur de risque	L'essentiel
Maïs : les parcelles du réseau sont entre les stades 9 feuilles et 15 feuilles.		
Sésamie	Un seul piégeage cette semaine.	
Pyrale	Les conditions climatiques restent favorables aux vols. Le pic de vol est probablement atteint sur la région. La pression est moyenne avec 3.5 pyrales/piège	

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTU SANTE : l'ambrosie à feuille d'armoïse. Cette plante invasive produit un pollen très allergisant.

Pour savoir pourvoir l'identifier et s'informer sur la plante. [Ambrosie-Fredon Bretagne—Cliquez ici](#)

Le datura stramoine. Une plante invasive toxique. Pour savoir pourvoir l'identifier et s'informer sur la plante. [Datura Fredon Bretagne—Cliquez ici](#)

ACTU BIODIVERSITE: Les notes nationales du moment sur la biodiversité.



A SURVEILLER : Les organismes nuisibles de quarantaine à surveiller.

Ces organismes ne sont pas encore présents en France, ils font cependant l'objet d'une surveillance importante à l'échelle nationale. Pour la culture du maïs, il en existe 4 actuellement :

- Le scarabée japonais (*Popillia japonica*) - [fiche d'identification—cliquez ici](#)
- Légionnaire d'automne (*Spodoptera fugiperda*) - [fiche d'identification—cliquez ici](#)
- Le diabrotica (*Diabrotica barberi*) - [fiche d'identification—cliquez ici](#)
- Flétrissement bactérien du maïs (*Pantoea stewartii*) - [fiche d'identification—cliquez ici](#)

En cas d'une suspicion, merci de me contacter :

damien.leclercq@fredon-bretagne.com ou au 07.63.57.60.84

Dégâts faune sauvage sur maïs

Pour chaque dégât occasionné par la faune sauvage, les agriculteurs sont invités à remplir à chaque fois le formulaire de déclaration en ligne ([formulaire : cliquez-ici](#)) ou via une application mobile disponible sur android et apple : [cliquez-ici pour savoir comment les télécharger](#). Cette déclaration, si elle n'ouvre pas droit à l'indemnisation, permet d'orienter les mesures de gestion de l'espèce et de justifier du maintien du classement en « nuisible ».

Données météo

[Retour
sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C juin (Normales)	Températures moyennes en °C 1-8 juillet (Normales)	Précipitations Cumul en mm juin (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-8 juillet (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	20.1 (17.3)	20.4 (19.6)	16.6 (50.9)	7.8 (44)
	Miniac-Morvan	19 (17.3)	18.4 (19.6)	76.6 (50.9)	6.6 (44)
	Langon	20.5 (17.3)	21 (19.6)	16 (50.9)	6.4 (44)
Finistère	Brest	17.3 (15.5)	17.2 (17)	53.1 (64.6)	12.3 (70.7)
	Landivisiau	17.4 (15.5)	17 (17)	47.4 (64.6)	9 (70.7)
	Quimper	17.8 (15.5)	18.6 (17)	48.8 (64.6)	9.5 (70.7)
Morbihan	St-Avé	19.6 (16.4)	20.2 (18)	39.8 (52)	2.6 (55.2)
	Pontivy	19.6 (16.4)	19.6 (18)	20.4 (52)	2.2 (55.2)
	Taupont	20.2 (16.4)	20 (18)	33.8 (52)	4.2 (55.2)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	17.8 (15.5)	17.3 (17.2)	62.8 (50.7)	6.8 (41.9)
	Louargat	17.9 (15.5)	16.9 (17.2)	34.6 (50.7)	8.6 (41.9)
	St Glen	18.6 (15.5)	17.8 (17.2)	37.2 (50.7)	10 (41.9)

Données météo, du 1^{er} juin au 8 juillet 2025 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Maïs

La sésamie du maïs (*Sesamia nonagriodes*)

- Observations issues des parcelles du réseau

Cette semaine, des captures ont été faites dans une seule parcelle située dans les Côtes-d'Armor (Dolo : 1 sésamie piégée au total) sur les 13 pièges relevés.

- Analyse de risque et prévisions

La pression reste **faible**.

Les températures annoncées pour les prochains jours pourraient rester favorables aux vols de sésamies.

Risque global :



faible.


- Informations sur le ravageur



La sésamie adulte, mesure environ 20 mm les ailes repliées. Les ailes antérieures sont brunes, les ailes postérieures blanches. Au niveau des symptômes, les dégâts sont visibles au stade 3-4 jusqu'à 10-12 feuilles. Ils se caractérisent par un dessèchement et disparition de plusieurs plantes successives et d'une grosse perforation à la base de la tige.

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site d'Arvalis.

[Fiche accident sésamie du maïs. \(Textes et photos. Source Arvalis\).](#)







La pyrale du maïs (*Ostrinia nubilalis*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb de pièges relevés	Nb pièges positif	Nb de pyrales capturés (sans - avec le site de Lantic)
03/07-08/07	20	15	Minimum: 1 Moyenne: 3,5 - 15,3. maximum :17 - 135 Total des captures: 67- 202
26/06-01/07	20	15	Minimum: 1 Moyenne: 2,8 - 8,9. Maximum :10 - 84 Total des captures: 55 - 139

La moyenne, le maximum et le total des captures sont présentés avec ou sans la valeur du site de Lantic. Le nombre de pyrales capturés sur ce site étant extrêmes par rapport aux autres sites, la valeur n'est pas incluse dans le graphique ci-dessous.

Le site de Lantic, situé dans les Côtes-d'Armor est connu localement pour sa forte pression en pyrale depuis plusieurs années.



Graphique 1 : évolution du nombre moyen de pyrales par piège selon l'année (hors valeur extrême de la parcelle de Lantic).

Carte 1 : état des captures de la pyrale.

• Analyse de risque et prévisions

Le vol se maintient avec un pic probablement atteint. Les températures de ces derniers jours ont été favorables aux vols de pyrales et le maintien de ces conditions climatiques (températures élevées et faible hygrométrie) vont sans doute encore être propices pour la poursuite de l'émergence des adultes. Les vols vont donc se poursuivre.

• Gestion du risque



Des méthodes de luttes alternatives existent.

Le trichogramme, une guêpe parasitoïde, permet de lutter contre la pyrale du maïs, il s'agit d'une méthode alternative de biocontrôle. Ce biocontrôle se présente sous forme de plaque contenant des oeufs de la guêpe. Le sachet doit être positionné dès qu'un début de vol est constaté (par l'intermédiaire du BSV par exemple), afin que les oeufs puissent éclore rapidement pour donner des adultes au moment de la période de ponte de la pyrale (quelques semaines après le début de vol).

Annexes

[Retour
sommaire](#)



PROCHAIN BSV : MARDI 15 JUILLET 2025

ABONNEMENT BSV

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants : La FREDON Bretagne : https://fredon-bretagne.com/ La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : https://bretagne.chambres-agriculture.fr/ La DRAAF Bretagne : https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/	
L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants : AGRIAL, ARVALIS, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, FREDON BRETAGNE,	Direction de Publication Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES Contact : Claire Ricono Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 41 Rédigé par : FREDON Bretagne 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq Tél : 07 63 57 60 84 Comité de Relecture : Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia
Pour recevoir gratuitement les BSV : Inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : Formulaire pour envoi de mail Ou contactez par mail l'animateur Grandes Cultures - Mail : damien.leclercq@fredon-bretagne.com Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques. <i>Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.</i>	