

Sommaire

[Données météo](#) **P2**

[Céréales](#) **P2/P3**

[Colza](#) **P4/P5**

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

Action de la stratégie
écophyto 2030 pilotée par
les ministères chargés de
l'Agriculture, de
l'Environnement, de la
Santé et de la Recherche,
avec le soutien financier de
l'Office français de la
biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour
pollutions diffuses
attribués au financement
du plan Ecophyto.

	Indicateur de risque	L'essentiel
Céréales	Stades 1-2 F. 	Les parcelles du réseau BSV sont majoritairement entre les stades « première feuille étalée et deuxième feuille étalée ».
Pucerons	Stade levée 	Le puceron est observé dans moins de la moitié des parcelles du réseau. La douceur prévue en fin de semaine (températures >10-12°C) sera favorable aux pucerons. Il faut observer ses parcelles afin de vérifier la présence ou non de pucerons. Pour rappel, le risque puceron ne concerne que les variétés non tolérantes à la JNO.
Limaces		La situation a peu évolué depuis la semaine dernière. Attention au retour de conditions climatiques favorables.
Colza - larves de grosses altises : il est possible d'observer les larves d'altises issues des vols de septembre à début octobre. Pour évaluer le risque parcellaire, vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia. Pour le consulter cliquez sur ce lien : OAD risque larve grosse altise. Hernie des crucifères : Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, remplir l'enquête de Terres-Inovia. Enquête Hernie—cliquez ici		

LES ACTUALITES DU MOMENT


ACTU TECHNIQUE : Bien observer les pucerons sur céréales.

L'observation doit se faire idéalement en l'absence de pluie et aux heures les plus chaudes. Il faut observer 10 pieds de céréales consécutifs dans 5 zones différentes de la parcelle (soit 50 plantes). Les pucerons se trouvent à l'aisselle des feuilles ou à la base du collet.

Vous trouverez plus de détails sur la méthodologie d'observation, les conditions favorables et l'identification des pucerons dans [le BSV n°34 du 18 novembre 2025](#).
[Pour le consulter—cliquez ici](#).



Puceron des céréales
Rhopalosiphum padi
À gauche : forme aptère
À droite : forme ailée et 2 aptères
Source : Fredon Bretagne



ACTU BIODIVERSITE : les notes nationales sur la biodiversité.

S'informer, comprendre et agir en cliquant sur l'un des items ci-dessous.



ACTU REGLEMENTAIRE :

Le site R4P : Réseau de réflexions et de recherches sur les résistances aux pesticides. Vous pouvez consulter ce site, qui vous présente des documents sur la résistance et sa gestion, [en cliquant sur ce lien](#).

Données météo

[Retour](#)
[sommaire](#)



Stations météo		Températures moyennes en °C octobre (Normales)	Températures moyennes en °C 1-25 novembre (Normales)	Précipitations Cumul en mm octobre (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-25 novembre (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	13.5 (13.2)	11.0 (9.2)	51.7 (73.1)	45.1 (73.2)
	Miniac-Morvan	13.1 (13.2)	10.9 (9.2)	84.8 (73.1)	79.4 (73.2)
	Langon	13.5 (13.2)	10.8 (9.2)	22.6 (73.1)	60.6 (73.2)
Finistère	Brest	13.0 (12.8)	11.4 (9.7)	96.7 (129.4)	104 (146.7)
	Landivisiau	12.9 (12.8)	11.3 (9.7)	106.1 (129.4)	95.1 (146.7)
	Quimper	13.6 (12.8)	11.4 (9.7)	114.5 (129.4)	114.6 (146.7)
Morbihan	St-Avé	13.8 (13.2)	11.3 (9.8)	63.4 (103.8)	55.4 (107.6)
	Pontivy	12.8 (13.2)	10.8 (9.8)	90.8 (103.8)	85 (107.6)
	Taupont	13.5 (13.2)	11.3 (9.8)	49.8 (103.8)	57.4 (107.6)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	13.0 (12.6)	11.1 (9.2)	69.0 (81.6)	70.4 (87.7)
	Louargat	12.3 (12.6)	10.3 (9.2)	74.8 (81.6)	66.6 (87.7)
	St Glen	12.5 (12.6)	10.5 (9.2)	70.6 (81.6)	102.8 (87.7)

Données météo, du 1^{er} octobre au 25 novembre 2025 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.


Blé et orge

Stades

29 parcelles, dont 17 de blé et 12 d'orge, ont été suivies entre le 20 novembre et le 25 novembre 2025. Elles sont majoritairement entre les stades première feuille étalée et deuxième feuille étalée.



Carte 1 : répartition géographique des stades du blé et de l'orge observés entre 20/11 et le 25/11 (semaine 48).



Graphique 1 : stades des parcelles de blé et d'orge du réseau.



Les pucerons d'automne


- Observations issues des parcelles du réseau

Observation sur plantes :

Période de suivie	Nb parcelles suivies	Nb parcelles dans la période de risque (levée-tallage)	Nb parcelles infestées	Nb parcelles au seuil de risque	Infestation moyenne (en %)
20/11-25/11	29	29	12	6	10.9 %
13/11-18/11	26	26	16	7	14.3 %

Les six parcelles qui ont atteint le seuil de risque sont des parcelles de blé.

A noter : Trois parcelles d'orge ont plus de 10% de plants infestés. Cependant les variétés sont tolérantes à la JNO (KWS DELIS, LG ZORICA et LG ZEBRA), par conséquent ces parcelles ne sont pas considérées à risque.



Carte 2 : répartition géographique des parcelles observées en fonction du seuil de risque puceron - observations faites entre le 20/11 et le 25/11 (semaine 48).

- Analyse de risque et prévisions

Le puceron est observé dans moins de la moitié des parcelles. Il est présent essentiellement dans les parcelles aux stades 1-2 feuilles étalées.

La douceur prévue ce week-end (températures >10-12°C) sera favorable aux pucerons. Il faut observer ses parcelles afin de vérifier la présence ou non de pucerons.

Pour rappel, le risque puceron ne concerne que les variétés non tolérantes à la JNO.

Pour les parcelles, au stade 1-2 feuilles : **moyen à fort**

Pour les parcelles tout justes levées : **faible à moyen**

- Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

De la levée jusqu'au stade « début tallage ».

Le seuil de risque ne concerne que les variétés non tolérantes à la JNO.

Seuil : 10% des pieds colonisés par au moins un puceron ou présence de pucerons pendant + de 10 jours dans la parcelle.



Attention, le recours systématique à une voire plusieurs applications, sans nécessité et en conditions non optimales, peut engendrer plus rapidement l'apparition de résistances.

La liste des variétés tolérantes et la méthodologie pour l'observation des pucerons, est à retrouver dans [le BSV n° 34 du 18 novembre 2025. Pour le consulter—cliquez ici.](#)

**Limace grise (*Deroceras reticulatum*) et limace noire (*Arion hortensis*)**

- Observations issues des parcelles du réseau

Observation sur plantes :

Période de suivie	Nb parcelles Entre levée et tallage	Nb parcelles avec dégâts	Nb parcelles au seuil de risque	Dégâts moyen (en %)
20/11-25/11	25	11	1	10.8 %
13/11-18/11	27	11	1	13.4 %

La parcelle qui a dépassé le seuil de risque, présente 60% des plants attaqués par les limaces. Il s'agit de la même parcelle que la semaine dernière, située dans le Finistère.

- Analyse de risque et prévisions

Les dégâts observés sont stables par rapport à la semaine dernière. Les conditions météo des prochains jours (retour de la douceur et présence de précipitations) seront favorables aux limaces. La surveillance est à maintenir jusqu'à 4 feuilles.

Risque global :  faible

- Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis jusqu'au stade « 3-4 feuilles ». Plus de 30% des plantes présentant des dégâts.

Les informations sur les différents leviers ainsi que la grille de risque sont à retrouver dans [le BSV n° 34 du 18 novembre 2025](#). [Pour le consulter—cliquez ici.](#)

Colza

Larves d'altises d'hiver : priorité à l'observation de vos propres parcelles

- Prévisions des périodes d'éclosion et stade larvaire

L'observation est plus aisée lorsque les larves ont atteint le stade L2. C'est également à ce stade qu'elles sont le plus fragiles. D'après le modèle, les larves issues des vols d'altises adultes de septembre au 10 octobre sont observables au stade L2 ou le seront dans les prochains jours.

La méthodologie pour l'observation des larves, est à retrouver dans [le BSV n° 34 du 18 novembre 2025](#). [Pour le consulter—cliquez ici.](#)

	Date théorique début de vol	Date théorique d'apparition du stade larvaire	
		Mue L2	Mue L3
22-Plouguenast	20-sept	01-nov	10-nov
	25-sept	06-nov	15-nov
	01-oct	13-nov	07-déc
	05-oct	20-nov	09-janv
	10-oct	23-déc	02-mars
29-Saint Segal	20-sept	25-oct	03-nov
	25-sept	31-oct	07-nov
	01-oct	06-nov	14-nov
	05-oct	11-nov	22-nov
	10-oct	16-nov	07-déc
35-Rennes	20-sept	24-oct	02-nov
	25-sept	01-nov	07-nov
	01-oct	06-nov	14-nov
	05-oct	12-nov	22-nov
	10-oct	16-nov	17-déc
56-Bignan	20-sept	28-oct	05-nov
	25-sept	03-nov	11-nov
	01-oct	08-nov	16-nov
	05-oct	13-nov	25-nov
	10-oct	19-nov	22-déc

 Période favorable à l'observation des larves

- Gestion du risque



Attention au risque de résistance aux pyréthriinoïdes. Plus de détails sur le site de [Terres inovia—les résistances aux pyréthriinoïdes.](#)

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du stade rosette jusqu'à décollement du bourgeon terminal.

Pour évaluer le risque vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia en cliquant sur l'icône.





Hernie des crucifères

La **hernie des crucifères**, maladie racinaire, provoque des renflements ou galls du système racinaire du colza et de nombreuses crucifères dès l'automne. **L'arrachage de pieds permet d'observer ces symptômes racinaires.**

Ces hypertrophies sont de forme et de grosseur variables. Les galls sont d'abord fermes (intérieur plein) et blanches, puis brunissent et se craquellent, puis pourrissent. La dégradation du système racinaire entraîne la mort de la plante dans la majorité des cas. Les symptômes observés sur les parties aériennes vont du flétrissement temporaire du feuillage, au cours de chaudes journées, à un défaut de croissance et à un rougissement des plantes infectées. Avant l'apparition des symptômes sur feuilles, la maladie peut déjà avoir progressé considérablement dans les racines.

(Source texte et photo : Terres-Inovia).



- **Les facteurs favorables sont :**

- Des sols limoneux à pH acide, hydromorphe et battant ;
- Des températures comprises entre 20-25°C et une humidité relative du sol supérieure à 80%. Les fortes orages et l'irrigation sont des facteurs aggravants en cas de présence de hernie ;
- Le retour fréquent du colza dans la rotation mais aussi l'implantation de crucifères comme CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) ;
- Un mauvais désherbage, notamment des crucifères, et le maintien des repousses de colza après la récolte ;
- D'autres facteurs favorisent également le développement de la maladie : semis précoce, mauvais drainage de la parcelle ou l'absence de chaulage pour les sols acides ;

Attention à la dissémination de la hernie ! Les outils de travail du sol souillés dans une parcelle infestée sont des vecteurs potentiels de la hernie, tout comme des végétaux contaminés, de l'eau d'irrigation ou des fumiers contaminés. (Source texte : Terres-Inovia).

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. [Fiche hernie des crucifères.](#)

Dans le BSV de cette semaine, aucun cas n'a été recensé. Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, n'hésitez pas à remonter l'information en remplissant l'enquête menée par Terres-Inovia ci-contre. [Enquête Hernie](#)

PROCHAIN BSV : MARDI 2 DECEMBRE

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants : ARVALIS, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, COOP GARUN-PAYSANNE, EUREDEN, FREDON BRETAGNE.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Claire Ricono. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 41

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :

La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>

La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : contactez par mail l'animateur Grandes Cultures Mail : Damien.leclercq@fredon-bretagne.com
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail.](#)