

En bref cette semaine :

Brocoli	Puceron cendré du chou	●	Présence de colonies dans le Morbihan
	Mouche du chou	●	Présence légère d'œufs et larves dans le Morbihan
Carotte	Mouche de la carotte	●	Captures en hausse
	Puceron	●	Légère présence de pucerons (noirs et verts)
Pois	Puceron	●	Captures stables (tous secteurs)
	Tordeuse du pois	●	Captures stables
	Maladies	●	Traces de mildiou et viroses (tous secteurs)
Haricot vert	Mouche des semis	●	Absence d'attaques

Note de risque :



Faible

A surveiller

Moyen

Fort



BROCOLI (14 FV à initiation)

Pucerons cendrés du chou : Risque moyen

Relevés, informations et observations :

Les colonies de pucerons cendrés du chou sont largement présentes dans toutes les régions.

Analyse de risque :

Les pucerons cendrés du chou peuvent générer des dégâts importants : déformation des feuilles centrales et/ou de la pomme, affaiblissement des cultures, développement de la fumagine (champignon provoquant des brûlures).

Peu de solutions prophylactiques existent : destruction des résidus de cultures, rotations longues, limitation des excès d'azote, favoriser la présence d'ennemis naturels (installation de haies, bandes enherbées et/ou fleuries en bordure de champ,..). Aucune technique alternative n'existe à ce jour.

Mouches du chou : Risque faible

Relevés, informations et observations :

Aucun œuf n'a été comptabilisé cette semaine. Des larves ont été observées dans d'autres parcelles du département.

Analyse de risque :

Le seuil de risque est fixé à 1 œuf / piège / jour après la reprise. Aucune parcelle suivie ne dépasse le seuil.

En cas de risque, il est conseillé d'irriguer le moins possible malgré la sécheresse actuelle afin de favoriser la mortalité des œufs. De plus, un travail du sol (labour, binage) perturbe l'émergence des adultes et le cycle biologique de ce ravageur.

En prévention, il est nécessaire de respecter un délai minimum de quatre ans entre deux cultures de Brassicacées, et de ne pas épandre de fertilisants organiques peu décomposés car ils attirent les mouches.

Autres insectes ravageurs : Risque moyen

Relevés, informations et observations :

Des vols de papillons (Piéride du chou) sont observés dans les parcelles de brocolis d'été. Vigilance sur les parcelles proches de la récolte, la pression due aux chenilles et aux papillons est en augmentation.

CAROTTE (2 FC à 3 cm)

Le réseau de piégeage se compose de 20 pièges fonctionnels.

Mouches de la carotte : Risque moyen

Relevés, informations et observations :


Les captures de mouches de la carotte sont en hausses (cf graphique page 3). Deux parcelles dépassent le seuil ; les captures varient entre 0 et 45 mouches. De part les conditions climatiques des derniers jours (fortes chaleurs, précipitations), il semblerait que le second vol ai débuté. Cela est à confirmer lors des prochains relevés.

Analyse de risque :

Le seuil de risque indicatif est de 5 mouches piégées / semaine / parcelle. **Le risque est modéré dans tous les secteurs.**

Afin de perturber le vol au maximum, il est conseillé de favoriser les habitats des ennemis naturels : carabes, hyménoptères ou encore staphylins, ainsi que de limiter les plantations de carottes dans les parcelles bordées par des haies ou bosquets (lieux de refuge des mouches). Enfin, le respect d'un délai de cinq ans entre deux cultures d'ombellifères réduit le risque de présence de mouches de la carotte.

Nombre moyen de mouches de la carotte piégées par semaine en 2022



Graphique de l'évolution du nombre moyen de Mouches de la carotte capturées par semaine en 2022 [25/04–24/06] (en bleu) en comparaison à la moyenne des captures entre 2000 et 2021 (en jaune) Morbihan et Finistère confondus.

Pucerons de la carotte : Risque faible

Relevés, informations et observations :

Cette semaine, le nombre observé de pucerons noirs et verts est faible.

Analyse de risque :

Plus l'attaque est précoce, plus les dégâts seront graves. Des déformations du feuillage, jaunissement des plantes surviennent de par l'injection de salive toxique injectée lors du prélèvement de sève. Mesures prophylactiques : attraction des auxiliaires (chrysopes, coccinelles), limitation des excès d'azote, entretien des bords de parcelles pour limiter la présence d'adventices servant de réservoirs à pucerons.

POIS (gousses 2^{ème} étage florifère à récolte)

Pucerons / viroses : Risque moyen

Relevés, informations et observations :

Le nombre de pucerons relevé sur les parcelles suivies est faible (< 10/50 pieds). L'alerte se trouve sur la présence de virus au sein des plants. En effet, les analyses virologiques ressortent positives pour le virus de la jaunisse apicale des pois (BLRV), et pour le virus de la mosaïque du navet (PsbMV) qui est présent en majorité.

Analyse de risque :

La charge virulifère des pucerons fait craindre des pertes, notamment dans les variétés sensibles. Le risque est très présent pour les cultures à semis tardif si les populations de pucerons augmentent (fortes chaleurs + précipitations).

Tordeuse du pois : Risque faible


Relevés, informations et observations :

Parmi les cinq parcelles de pois suivies pour la tordeuse, une a pu être relevée cette semaine. 24 tordeuses ont été comptabilisées, chiffre plus élevé que la moyenne des années précédentes (cf graphique ci-dessous). Une vigilance doit être portée sur les semis tardifs.

Analyse de risque :

Il n'y a pas de seuil de risque défini pour la Tordeuse du pois. L'alerte est lancée si leur présence est forte dans des stades de développement sensibles (de la floraison jusqu'à la récolte). Il n'existe pas de mesures prophylactiques contre la Tordeuse.

Nombre moyen de tordeuses du pois capturées en 2022 comparé à la moyenne 2008-2021



Graphique de l'évolution du nombre moyen de Tordeuses du pois mâles capturées par semaine en 2022 [16/05–24/06] (en bleu) en comparaison à la moyenne des captures entre 2008 et 2021 (en orange) Morbihan et Finistère confondus.

Maladies : Risque moyen

Relevés, informations et observations :

Certaines parcelles sont touchées par du mildiou, notamment les cultures qui vont être récoltées prochainement.

Les conditions climatiques de la semaine passée (fortes températures et ensoleillement, précipitations) ont favorisé son installation.

Un autre point de vigilance est à porter dans les cultures subissant des nécroses racinaires. La sécheresse actuelle et les nécroses affaiblissent les cultures, ce qui peut affecter considérablement les rendements.

Analyse de risque :

Afin de limiter le développement du mildiou, il est important de respecter un délai de cinq ans entre deux cultures de pois. Il faut également détruire les repousses de pois dans les cultures suivantes.

HARICOT VERT (semis à filets)

Mouche des semis : Risque faible

Relevés, informations et observations :

Les attaques de la mouche du semis sont nulles dans l'ensemble des secteurs. Les cultures sont saines, les fleurs et feuilles ont cependant subi des brûlures de part le fort ensoleillement de la semaine dernière.

Analyse de risque :

L'observation des individus est très difficile. Leur présence est connue via les dégâts observés sur les parcelles : perte de densité, galeries creusées dans les plants, cotylédons endommagés, destruction du bourgeon terminal du pois.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisé par les partenaires suivants :

EUREDEN, TERRES DE L'OUEST, GN SOLUTIONS, UNILET

Direction de Publication

Chambre d'Agriculture de Bretagne
12, avenue du général Borgnis Desbordes – BP398
56009 Vannes Cedex
02.97.46.22.41
Contact : Lise LOLLIVIER

Rédaction : UNILET

6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperlé Cedex

Contacts :

Pierre LE FLOCH, Eric KERLOC'H

Animateur légumes industrie 02 98 39 33 24

- Comité de Relecture :

UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture