



Pomme de terre
Bulletin N°6 – du 9 juillet 2026

Doryphores

Doryphores

Biocontrôle

Insectes auxiliaires

Et santé des agro-écosystèmes

[clic]

Note nationale Biodiversité

Ministère de l'Environnement


Logo of the French Republic

Logo of the National Biodiversity Note

La résistance aux ppp

Climatologie

Cumul des pluviométries du 1 au 8 juillet 2026



*Données : Agrimétéobretagne, visuel Météo-data,
Stations : Brest-Guipavas (29), Briec (29), Évellys (56), Kerpert (22), Louargat (22), Plonéour-Lanvern (29), Ploudalmézeau (29), Taupont (56), Meslan (56), Saint-Igneuc (22), Lanvéoc (29), Dompierre-Du-Chemin (35), Landujan (35), Pleslin-Trigavou (22), Perros-Guirec (22), Langon (35), Cléguérec (56), Pléchâtel (35), Pleumeur-Gautier (22), Thorigné-Fouillard (35), Lorient (56), Quimper (29), Melgven (29), Châteaubourg (35), Cintré (35), Plounéventer (29), Plounévez-Quintin (22), Saint-Gonnery (22) et Saint Eloy (29).*

*Données : Agrimétéobretagne, visuel Météo-data,
Stations : Brest-Guipavas (29), Briec (29), Évellys (56), Kerpert (22), Louargat (22), Plonéour-Lanvern (29), Ploudalmézeau (29), Taupont (56), Meslan (56), Saint-Igneuc (22), Lanvéoc (29), Dompierre-Du-Chemin (35), Landujan (35), Pleslin-Trigavou (22), Perros-Guirec (22), Langon (35), Cléguérec (56), Pléchâtel (35), Pleumeur-Gautier (22), Thorigné-Fouillard (35), Lorient (56), Quimper (29), Melgven (29), Châteaubourg (35), Cintré (35), Plounéventer (29), Plounévez-Quintin (22), Saint-Gonnery (22) et Saint Eloy (29).*

La semaine passée a de nouveau été marquée par une forte instabilité thermique. Les premiers jours ont été plus doux et couverts. Puis une nouvelle vague de chaleur s'est ensuite installée en fin de semaine, avec des températures dépassant à nouveau les 35°C. Seul le nord du littoral, a été un peu épargné, avec des maximales plus modérées autour de 25-29°C. Ce nouvel épisode caniculaire, dans un contexte globalement sec, s'est traduit par une absence quasi totale de développement du mildiou sur la majorité des parcelles, tout en accentuant fortement le stress hydrique des cultures. Les tubercules entrent ainsi rapidement en phase de sénescence, sans gain de calibre supplémentaire, notamment sur les parcelles les moins bien alimentées en eau.

Stades des cultures



Plants et consommation


Les floraisons s'achèvent et les défanages se poursuivent. Les tubercules sont en cours de grossissement, bien que des difficultés à atteindre les calibres souhaités soient rapportées.

Mildiou

♦ Observations

L'observation de **mildiou** est restée **anecdotique** sur l'ensemble des parcelles observées.

Mildiou observé du 1 au 8 juillet 2026



- Absence
 ● Une feuille avec au moins 1 tache ou 1 attaque sur tige
 ● Quelques feuilles ou tiges avec au moins 1 tache
 ● Quelques pieds contaminés (tiges + feuilles)

♦ Gestion du risque

Pour une lutte efficace :



Détruire immédiatement les tas de déchets par chaulage ou bâchage. Il s'agit de la première source d'inoculum pour les parcelles environnantes.

Agir en préventif.

Visiter très régulièrement les parcelles.

Pucerons

♦ Observations

Les pucerons ont **été absents des dernières captures.**

♦ Pomme de terre plants

Les pucerons sont dommageables en production de plants de pomme de terre, même en faible effectif.

♦ Pomme de terre de consommation

Les attaques de pucerons peuvent avoir un effet dépressif sur la plante.

*Le seuil de nuisibilité en consommation est de **20 folioles porteuses de pucerons** sur 40 observées.*

♦ Gestion du risque



En plant la protection en préventif avec de l'huile est efficace contre la transmission des virus.



Doryphores

♦ Observations

Doryphores observés du 1 au 8 juillet 2026




Les populations de doryphores ont drastiquement diminué sur l'ensemble du territoire.

*Le seuil de nuisibilité pour ce ravageur est atteint dès qu'on observe en bordure de parcelle **2 foyers pour 1000 m²** (1 foyer = 1 ou 2 plantes avec au moins **20 larves** au total).*



Doryphore adulte en cours de ponte. Repousse de pommes de terre dans une parcelle de pois. Présence de 4 sites de ponte sur la photo. Photo Bretagne Plants Innovation

Carte des communes du réseau d'observation

Le réseau d'observation, composé de 15 parcelles, a permis de recueillir les informations pour ce Bulletin de Santé du Végétal. Sur les communes de Dirinon (29), Guiclan (29), Irvillac (29), Lanhouarné (29), Lanrivoaré (29), Le Tréhou (29), Locmélard (29), Morlaix (29), Neulliac (56), Ploudalmézeau (29), Plouguin (29), Saint-Divy (29) et Saint-Urbain (29).

Action co-pilotée par les ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche avec l'appui financier de l'Office Français pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto. Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

Les observations contenues dans ce bulletin ont été réalisées par les partenaires suivants : Bretagne Plants Innovation, Bretagne-Plants, Le gouessant, et Semences de Bretagne.

Direction de publication

Chambre d'agriculture de Bretagne, 12 Avenue du Général Borgnis Desbordes BP 398 Vannes 56009
Françoise MAHEO, animatrice inter-filière,
Tel : 06.43.18.94.19

Rédigé par :

Bretagne Plants Innovation,
471, lieu-dit La Gare 29460 HANVEC
Vincent MATHIEU, Tél. 07.89.70.83.37
v.mathieu@plantsdebretagne.com

Comité de relecture :

Chambres d'agriculture de
Bretagne, DRAAF-SRAL, Bretagne
Plants Innovation